



آمادگی اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران سرپایی:



تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ کد پمفلت: PA-۰۵-۱۰۲۲ شماره بازنگری: ۰۰

- ❖ روز انجام اکو مری، بیمار باید به مدت ۵ ساعت ناشتا باشد.
- ❖ در صورت وجود یا سابقه بیماری‌های گوارشی مانند: خونریزی گوارشی، اختلال در بلع، عمل جراحی سیستم گوارشی، سابقه استفراغ خونی یا مدفوع سیاه اطلاع دهید.
- ❖ در صورت مصرف قرص وارفارین، آپیکسابان، ریواروکسابان، دابیگاتران، آمپول انوکسپارین یا داروهای ضد انعقاد دیگر، از روز قبل انجام اکو با مشورت پزشک معالج دارو باید قطع شود.
- ❖ در صورت مصرف وارفارین باید آزمایش (PT, INR) روز قبل از اکومری انجام شود و با در دست داشتن جواب آزمایش جهت انجام اکومری مراجعه کنید.
- ❖ در بیمارانی که شک به اختلالات خونریزی دهنده وجود دارد انجام آزمایشات PT, BT, CT, CBC, PTT، و تعیین سطح پلاکت الزامی است.
- ❖ در زمان انجام اکو، مدارک پزشکی اعم از (نوار قلب، اکوهای قبلی، آنژیوگرافی و اسکن قلب، مدارک مرتبط با جراحی قلبی و...) را همراه داشته باشد.
- ❖ قبل از انجام اکومری و پس از ارائه توضیحات لازم رضایت از شما گرفته می‌شود.
- ❖ افراد مبتلا به دیابت در صورتی که از قرص خوراکی دیابت مانند: گلی بنکلامید یا متفورمین برای کنترل بیماری استفاده می‌کنند نباید صبح روز انجام تست، داروی خود را مصرف کنند و در صورتی که از انسولین استفاده می‌کنند، دوز داروی صبح خود را تزریق نکنند.

دستورات بعد از انجام اکومری:

- ❖ اغلب در حین اکو داروی خواب آور تزریق می‌شود، باید در روز اکو یک نفر همراهی داشته باشید و در کل آن روز از انجام رانندگی و هر فعالیتی که نیاز به دقت و یا احتیاط دارد، خودداری کنید.
- ❖ ۲ تا ۳ ساعت بعد از انجام تست باید ناشتا بمانید و بعد از آن می‌توانید مایعات سرد و سپس ولرم بنوشید. در صورت عدم مشکل و تحمل رژیم غذایی، می‌توانید رژیم جامد نرم را از ۵ الی ۶ ساعت بعد با احتیاط شروع نمایید.
- ❖ احساس سفتی یا کرختی در گلو، خواب آلودگی و ضعف مختصر ممکن است تا چند ساعت باقی بماند.



آمادگی اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران سرپایی:



تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ کد پمفلت: PA-۰۵-۱۰۲۲ شماره بازنگری: ۰۰

- ❖ روز انجام اکو مری، بیمار باید به مدت ۵ ساعت ناشتا باشد.
- ❖ در صورت وجود یا سابقه بیماری‌های گوارشی مانند: خونریزی گوارشی، اختلال در بلع، عمل جراحی سیستم گوارشی، سابقه استفراغ خونی یا مدفوع سیاه اطلاع دهید.
- ❖ در صورت مصرف قرص وارفارین، آپیکسابان، ریواروکسابان، دابیگاتران، آمپول انوکسپارین یا داروهای ضد انعقاد دیگر، از روز قبل انجام اکو با مشورت پزشک معالج دارو باید قطع شود.
- ❖ در صورت مصرف وارفارین باید آزمایش (PT, INR) روز قبل از اکومری انجام شود و با در دست داشتن جواب آزمایش جهت انجام اکومری مراجعه کنید.
- ❖ در بیمارانی که شک به اختلالات خونریزی دهنده وجود دارد انجام آزمایشات PT, BT, CT, CBC, PTT، و تعیین سطح پلاکت الزامی است.
- ❖ در زمان انجام اکو، مدارک پزشکی اعم از (نوار قلب، اکوهای قبلی، آنژیوگرافی و اسکن قلب، مدارک مرتبط با جراحی قلبی و...) را همراه داشته باشد.
- ❖ قبل از انجام اکومری و پس از ارائه توضیحات لازم رضایت از شما گرفته می‌شود.
- ❖ افراد مبتلا به دیابت در صورتی که از قرص خوراکی دیابت مانند: گلی بنکلامید یا متفورمین برای کنترل بیماری استفاده می‌کنند نباید صبح روز انجام تست، داروی خود را مصرف کنند و در صورتی که از انسولین استفاده می‌کنند، دوز داروی صبح خود را تزریق نکنند.

دستورات بعد از انجام اکومری:

- ❖ اغلب در حین اکو داروی خواب آور تزریق می‌شود، باید در روز اکو یک نفر همراهی داشته باشید و در کل آن روز از انجام رانندگی و هر فعالیتی که نیاز به دقت و یا احتیاط دارد، خودداری کنید.
- ❖ ۲ تا ۳ ساعت بعد از انجام تست باید ناشتا بمانید و بعد از آن می‌توانید مایعات سرد و سپس ولرم بنوشید. در صورت عدم مشکل و تحمل رژیم غذایی، می‌توانید رژیم جامد نرم را از ۵ الی ۶ ساعت بعد با احتیاط شروع نمایید.
- ❖ احساس سفتی یا کرختی در گلو، خواب آلودگی و ضعف مختصر ممکن است تا چند ساعت باقی بماند.