

حصى الكلي



# خاص: للمرضى

أخر موعد للاعادة النظر: 21-11-2024

تاريخ المراجعة التالية: 21-11-2027

كودالكتيب: PA-59-1007

رقم الاعادة النظر: ١٠

امسح الرمز الشريطي أدناه للوصول إلى المعلومات التعليمية



النائب للتعليم و الصحه منتج: القسم IPD القسم التعليم و الصحه الرجوع إلى الوقت المحدد لإزالة الغرز

ابدأ أنشطتك بالتدريج

تجنب حمل الأوزان الثقيلة والرياضات الثقيلة

الرجوع إلى المختبر لتحديد نوع الحجر

الامتناع عن النشاط الجنسى لمدة أسبوعين

#### مصادر:

كتاب جراحة المسالك البولية العامة للدكتور سيم فروش دليل الدكتور كامران أحمدى

كتاب برونر للتمريض الداخلى والجراحة ترجمة الدكتورة مريم حضراتي وزهراء نسايح

اذا كانت لديك سوال او مشكله من حيث الـمـرض تستطيع مجانا كل يوم من الساعه ٨ الى ١٢ صباحا الا ايام العطل تشير الى او اتصل بالقسم عيادة التثقيف الصحى

الهاتف: ۵۱۳۱۸۰۲۷۴۸

الموقع الكتروني:

https://emamreza.mums.ac.ir

إذا كنت تعانى من مشاكل فى التبول أو توقفت عن التبول ُ فجأة ، فاستشر الطبيب أو اتصل بغرفة الطوارئ

في حالة الحمى ، راجع الطبيب أو اتصل بغرفة الطوارئ

إذا تم تركيب خرطوم DJ ، فارجع بعد أسبوعين لإزالته

إذا خرجت باستخدام قسطرة بولية ، فضع القسطرة أسفل مستوى الجسم وقم بإزالة البول بانتظام والعودة فى الموعد المحدد لإزالة القسطرة.



# 🔊 جراحة الكلى المغلقة


فى حالة الجراحة المغلقة ، من الطبيعى أن ترى القليل من الإفرازات من مكان العملية ، فحاول النوم على الجانب الآخر ووضع ضمادة نظيفة على الجرح ، وإذا زادت الإفرازات ، راجع الطبيب.



۵

#### عزيزي المريض

أطيب التمنيات بالصحة، هذه المقالة مقدمة من أجل تعريفك بمرض حصوات الكلى والعناية بها ، ونأمل أن يـكـون لـديـك علاج قصير





## م كيف تتكون حصوات الكلي

وهي جزيئات صغيرة ولكنها شديدة الصلابة تتشكل في كلية واحدة أو كليهما وأحيانًا في الأنابيب الضيقة للحالب ويتم نقلها من الكليـة

يختلف حجمها من حبهٔ رمل إلى كرهٔ جولف ، وقد تكون واحدهٔ أو أكثر ، وغالبًا ما تحدث في القنوات الإدارية ، وإذا كانت صغيرة لا تظهر عليها أي أعراض ، ولكن إذا كان حجمها أكبر من ٣ مم القناة مغلقة ومؤلمة تسبب ألما شديدا في الجنب والظهر وحتى الفخذ

كل ٢٠ إلى ٤٠ دقيقة ، يتكرر الألم ، ويعود الألم

يعانى المريض أحيانًا من ألم في الخصيتين وألم مستمر في الظهر في الفخذ أو الظهر ، والتي تستمر من بضع دقائق إلى بضع ساعات

ألم وحرقان أثناء التبول

وجود دم في البول

استفراغ و غثيان

- التبول المتكرر

الأرق

السبب الرئيسي لحصوات الكلي هو الاستهلاك المفرط للملح والبروتين

## م كيفية التشخيص

تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية وصورة بسيطة ، صورة ملونة قابلة للحقن ، مسح مقطعي للبطن والحوض ، اختبارات الدم والبول ، وفحص النظام الغذائي للمريض من قبل أخصائي

#### محكيفية المعاملة

في معظم الحالات ، يتم علاجه عن طريق وصف المسكنات ولكن إذا كانت الحصوات كبيرة ، يقوم الجراح بسحقها وإزالتها من الجسم من خلال عملية تكسير الحجارة في المسالك

مزايا المحاجر من القناة

- ليست هناك حاجهٔ لعمليهٔ جراحيهٔ
  - خطر العدوى والنزيف أقل
  - لا يشعر الشخص بألم أو أنه جزئي
- يخرج المريض من المستشفى ويعود إلى المنزل بعد بضع

## الجراحة الجراحة

في كثير من الأحيان ، يخرج المريض من المستشفى بعد إزالة

إذا لم يكن لديك قيود على شرب السوائل ، اشرب ما لا يقل عن ٨ إلى ١٠ أكواب من السوائل يوميًا

ابق في المنزل لمدة ٢۴ ساعة على الأقل ، في حالة حدوث تنميل من الظهر ، استلق لمدة ۴۸ ساعة

تساعد ممارسهٔ الرياضهٔ والمشي على إزالهٔ الحصي ، ولكن تجنب الرياضات الثقيلة

لا تقلق إذا كان هناك كمية صغيرة من الدم في البراز أو حرقة طفيفة وسيتم حل الألم عن طريق تناول السوائل ومسكنات الألم لا تقلق ايدا !

إذا وصفت لك مضادات حيوية ، فتأكد من تناولها بانتظام

النشاط الجنسي محظور لمدة تصل إلى ١٠ أيام!

ضبط استهلاك الملح واللحوم والمكسرات والبهارات

يمكنك الاستحمام على الفور في عملية تكسير الحجارة في