



آمادگی های لازم جهت کلونوسکوپی بیماران (سرپایی): (نحوه آماده سازی پودر پگ)



تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ کد پمفلت: PA-۴۵-۱۰۰۵ شماره بازنگری: ۰۱

دستور زیر را به دقت اجرا کنید تا کلونوسکوپی شما در همان نوبت اول به خوبی انجام شود، در صورتی که داروها ناقص مصرف شود یا طبق دستور مصرف نشود، روده ها تمیز نشده و بایستی تمام مراحل زیر و کلونوسکوپی مجدداً تکرار گردد.

۱- از ۲۴ ساعت قبل از کلونوسکوپی باید از رژیم مایعات صاف شده بدون تفاله استفاده شود مانند آب سینه مرغ، آب گوشت یا ماهیچه و به هیچ عنوان از مواد جامد مانند (نان، گوشت، برنج، حبوبات، سبزیجات و ...) استفاده نشود.

مایعات نظیر چای، آبمیوه مجاز است. با چای خود می‌توانید قند استفاده کنید اما هرگز از خرما، نقل، کشمش و توت استفاده نکنید. از مصرف آبمیوه دارای تکه های جامد نیز پرهیزید.

۲- از خوردن لبنیات مانند (شیر، ماست، دوغ، خامه و...) نیز پرهیز کنید.

۳- تحرک زیاد مانند پیاده روی به تمیز شدن روده ها کمک می‌کند.

داروهای مورد نیاز: چهار بسته پودر اتیلن گلیکول (پگ)-۸ عدد قرص بیزاکودیل

طرز تهیه پودر: دو بسته پودر پگ را در دو لیتر آب حل نموده و در عرض ۲ ساعت (هر یک ربع یک لیوان یا ۲۵۰ سی سی) مصرف نمایید.

روز قبل از کلونوسکوپی ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح دو بسته پودر در دو لیتر آب حل کرده (هر یک ربع یک لیوان در عرض دو ساعت) مصرف نمایید.

مجدد همان روز (روز قبل از کلونوسکوپی) ساعت ۹ تا ۱۱ شب مجدداً دو بسته پودر را در دو لیتر آب حل نموده و در دو ساعت (هر یک ربع یک لیوان) مصرف نمایید.

از ساعت ۶ صبح (روز قبل از کلونوسکوپی) هر ۶ ساعت دو عدد قرص بیزاکودیل مصرف کنید.

از ساعت ۱۲ شب دیگر چیزی مصرف نکنید. (ناشتای کامل باشید)

مصرف داروهای ضد فشارخون و سایر داروها در طول دوره آمادگی ادامه یابد.

بیماران قلبی، کلیوی و بیمارانی که داروی آسپرین یا پلاویکس مصرف می‌کنند پزشک خود را آگاه سازند.

دقت داشته باشید حتماً با یک نفر همراه جهت انجام کلونوسکوپی مراجعه نمایید. رانندگی بعد از انجام کلونوسکوپی ممنوع است.

تهیه کننده: بخش آندوسکوپی بیمارستان امام رضا (ع)



آمادگی های لازم جهت کلونوسکوپی بیماران (سرپایی): (نحوه آماده سازی پودر پگ)



تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ کد پمفلت: PA-۴۵-۱۰۰۵ شماره بازنگری: ۰۱

دستور زیر را به دقت اجرا کنید تا کلونوسکوپی شما در همان نوبت اول به خوبی انجام شود، در صورتی که داروها ناقص مصرف شود یا طبق دستور مصرف نشود، روده ها تمیز نشده و بایستی تمام مراحل زیر و کلونوسکوپی مجدداً تکرار گردد.

۱- از ۲۴ ساعت قبل از کلونوسکوپی باید از رژیم مایعات صاف شده بدون تفاله استفاده شود مانند آب سینه مرغ، آب گوشت یا ماهیچه و به هیچ عنوان از مواد جامد مانند (نان، گوشت، برنج، حبوبات، سبزیجات و ...) استفاده نشود.

مایعات نظیر چای، آبمیوه مجاز است. با چای خود می‌توانید قند استفاده کنید اما هرگز از خرما، نقل، کشمش و توت استفاده نکنید. از مصرف آبمیوه دارای تکه های جامد نیز پرهیزید.

۲- از خوردن لبنیات مانند (شیر، ماست، دوغ، خامه و...) نیز پرهیز کنید.

۳- تحرک زیاد مانند پیاده روی به تمیز شدن روده ها کمک می‌کند.

داروهای مورد نیاز: چهار بسته پودر اتیلن گلیکول (پگ)-۸ عدد قرص بیزاکودیل

طرز تهیه پودر: دو بسته پودر پگ را در دو لیتر آب حل نموده و در عرض ۲ ساعت (هر یک ربع یک لیوان یا ۲۵۰ سی سی) مصرف نمایید.

روز قبل از کلونوسکوپی ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح دو بسته پودر در دو لیتر آب حل کرده (هر یک ربع یک لیوان در عرض دو ساعت) مصرف نمایید.

مجدد همان روز (روز قبل از کلونوسکوپی) ساعت ۹ تا ۱۱ شب مجدداً دو بسته پودر را در دو لیتر آب حل نموده و در دو ساعت (هر یک ربع یک لیوان) مصرف نمایید.

از ساعت ۶ صبح (روز قبل از کلونوسکوپی) هر ۶ ساعت دو عدد قرص بیزاکودیل مصرف کنید.

از ساعت ۱۲ شب دیگر چیزی مصرف نکنید. (ناشتای کامل باشید)

مصرف داروهای ضد فشارخون و سایر داروها در طول دوره آمادگی ادامه یابد.

بیماران قلبی، کلیوی و بیمارانی که داروی آسپرین یا پلاویکس مصرف می‌کنند پزشک خود را آگاه سازند.

دقت داشته باشید حتماً با یک نفر همراه جهت انجام کلونوسکوپی مراجعه نمایید. رانندگی بعد از انجام کلونوسکوپی ممنوع است.

تهیه کننده: بخش آندوسکوپی بیمارستان امام رضا (ع)