




کلونوسکوپي چیست؟



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۴۵-۱۰۰۳

شماره بازنگری: ۰۳

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش کلینیک داخلی - واحد آموزش سلامت

به اطلاع متخصص محترم گوارش و نیز متخصص بیهوشی مربوط رسیده شود. مدارک مربوط به بیماری نیز همراهتان باشد.

آیا رضایت نامه جهت کلونوسکوپي نیاز است؟

با آگاهی از ضرورت انجام کلونوسکوپي، روش انجام و عوارض احتمالی فرم رضایت نامه ای را در بخش آندوسکوپي در اختیار شما قرار می دهند که با آگاهی کامل تکمیل و امضا کنید.

چه موقع از نتایج آزمایش مطلع خواهید شد؟

برخی از نتایج بعد از اتمام معاینه به شما گفته خواهد شد. ولی اگر نمونه بافتی گرفته شود این نمونه برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه آسیب شناسی (پاتولوژی) ارسال خواهد شد که نتیجه ممکن است چند روز تا چند هفته به طول بینجامد.

با توجه به تعداد زیاد بیماران نیازمند اقدامات تشخیصی و درمانی مانند آندوسکوپي، کلونوسکوپي و ERCP انجام این اقدامات برای شما ممکن است با کمی تاخیر (تا چند روز) انجام شود، لذا لطفاً صبور باشید و با تیم درمان همکاری نمایید.

منابع

کتاب اصول طب داخلی هاریسون (بیماری های دستگاه گوارش) ۲۰۲۲
کتاب پرستاری برونر و سودارث (گوارش) ۲۰۲۲

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

مراقبت بعد از انجام کلونوسکوپي چیست؟

بعد از انجام کلونوسکوپي شما تا حدود نیم ساعت تحت نظر خواهید بود اما گاهی ممکن است حدود یک ساعت طول بکشد تا اثر داروهای مسکن از بین برود.

این امکان وجود دارد که برای مدت چند ساعت بعد از انجام معاینه دچار نفخ شکم یا احساس دفع گاز شوید؛ قدم زدن ممکن است ناراحتی شما را کاهش دهد. احتمالاً مقدار کمی خون در اولین دفع مدفوع بعد از انجام معاینه داشته باشید که معمولاً یک اخطار یا زنگ خطر نیست.

عوارض کلونوسکوپي شامل چه مواردی است؟

به طور کلی، کلونوسکوپي بی خطر است و عوارض آن غیر معمول می باشد. البته امکان بروز این عوارض وجود دارد.

* خونریزی از محل بیوپسی یا خارج کردن پولیپ که معمولاً جزئی است و در بیشتر مواقع نیاز به مداخله درمانی ندارد.

* پارگی یا سوراخ شدن کولون که عارضه جدی ولی غیر رایج است و در کمتر از یک در هزار رخ می دهد. در صورت به وجود آمدن این عارضه به طور معمول نیاز به جراحی اورژانسی میباشد، که البته این عارضه به طور کامل با جراحی درمان می شود.


* عوارض جانبی داروهای مورد استفاده به عنوان ضد درد یا خواب آور مانند حساسیت به دارو و یا اثرات ناخواسته را ذکر کنید زیرا گاهی نیاز به تجویز داروهای دیگری برای کنترل و درمان آنها می باشد.

* در صورت پیدایش علائم زیر هر چه سریعتر به پزشک خود اطلاع دهید:

- در صورت داشتن بیماری زمینه ای مانند بیماری های قلبی - عروقی و تنفسی، بیماری دیابت و ...

- درد شدید شکمی، اتساع و سفتی شکم، استفراغ و خونریزی بیشتر از چند قاشق





مددجوی گرامی:

با آرزوی سلامتی برای شما

این مطالب به منظور آشنایی با اقدام کولونوسکوپی تهیه شده است. امید است با مطالعه مطالب قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

کولونوسکوپی چیست؟

کولونوسکوپی یک روش تشخیصی بسیار ایمن و کم خطر است که اطلاعاتی درباره روده بزرگ (کولون) فراهم می‌کند که سایر روش‌های تشخیصی قادر به ارائه آن نیستند این کار توسط فوق تخصص بیماری‌های گوارش انجام می‌شود.

دیدن داخل روده بزرگ به وسیله دستگاه کولونوسکوپی از راه مقعد می‌باشد.

تا انتهای روده بزرگ و اغلب بخش انتهایی روده کوچک مورد بررسی قرار می‌گیرد این عمل به طور معمول به ۲۰ دقیقه تا یک ساعت زمان نیاز دارد.



آمادگی‌های لازم قبل از انجام کولونوسکوپی شامل چه مواردی است؟

برای به دست آوردن نتیجه مطلوب از انجام کولونوسکوپی، کولون (روده بزرگ) بیمار باید کاملاً آماده باشد تا دید کافی جهت بررسی پوشش داخلی روده بزرگ وجود داشته باشد. آمادگی با مصرف داروهای ملین که منجر به اسهال می‌شود ایجاد می‌گردد.

قبل از مراجعه باید موهای زائد اطراف مقعد کوتاه شوند.

توجه داشته باشید:

* از مصرف غذاهای جامد- جویدنی و مایعات رنگی (مخصوصاً قرمز رنگ) پرهیز نمایید. زیرا مایعات رنگی میتواند ترشحات روده را قرمز نموده و در تشخیص بیماری مشکل ساز باشد.

* مصرف قرص آهن و داروهای حاوی آهن را قطع کنید. زیرا آهن میتواند رنگ پوشش روده را تغییر دهد.

* اگر دچار بیماری قلبی، اختلال انعقادی خون و هرگونه بیماری زمینه‌ای دیگر هستید قبل از انجام کولونوسکوپی پزشک معالج خود را مطلع کنید.

نکاتی که حتماً باید به آن توجه کنید:

* در صورت مصرف دارو، حتماً به پزشک معالج اطلاع دهید. داروهایی مانند آسپیرین- وارفارین- پلاویکس و ریوارکسaban ممکن است خطر خونریزی را زیاد کنند.



مصرف برخی داروها مانند داروهای ضد فشارخون، ضد دیابت یا ضد تشنج نیز باید با توجه به حساسیت بیماری ادامه یابد، ولی باید به اطلاع پزشک معالج برسد.

* حضور همراهی برای شما ضروری است تا برای انتقال به منزل دچار مشکل نشوید.

* پس از کولونوسکوپی تا زمانی که اثر داروها از بین برود تحت نظر باقی می‌مانید. البته بهتر است در آن روز استراحت کنید و به کاری مشغول نشوید (از جمله رانندگی)

* شما می‌توانید پس از بازیابی هوشیاری خود، غذای معمولی خود را میل کنید.

روش انجام کولونوسکوپی به چه صورت است؟

کولونوسکوپ لوله ای انعطاف پذیر با قطری در حدود انگشت اشاره یعنی ۱۱ میلیمتر و مجهز به عدسی و منبع نور است و بدین وسیله پزشک می‌تواند تصویر را بر روی صفحه نمایشگری که در مقابل وی است مشاهده نماید. پیش از کولونوسکوپی جهت تزریق داروها توسط پرستار، برای شما سرم وصل میشود. کنترل علائم حیاتی شامل فشار خون- ضربان قلب و تنفس هم انجام می‌گیرد. ممکن است حین کولونوسکوپی به انجام بیوپسی (نمونه برداری کوچک بافتی) یا خارج کردن پولیپ (رشد بافت به داخل فضای روده) نیاز باشد که انجام آن بی درد است. گرچه اکثر افراد درباره درد و ناراحتی انجام کولونوسکوپی نگرانند ولی این کار به راحتی (گاهی با بیهوشی و یا بی حسی موضعی) و بدون درد انجام می‌گردد.