




بیوپسی کلیه



ویژه: بیماران


تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۰۸-۱۰۰۶

شماره بازنگری: ۰۲

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش اینترونشنال رادیولوژی - واحد آموزش سلامت

* تا دو هفته خصوصا در اطفال از انجام این ورزش ها خودداری کنید: ورزش های رزمی، ژیمناستیک، شنا، دوچرخه سواری، فوتبال، اسکی و...

در این موارد سریعاً به پزشک و اولین مرکز درمانی مراجعه شود:

* خونریزی یا ترشحات از محل نمونه برداری

* تپش قلب

* درد شدید

* احساس تنگی نفس

* تهوع و استفراغ مکرر

* سرگیجه

* تب بالا

* ضعف

منابع:

<https://www.elsevier.com/books/interventional-radiology-a-survival-guide/kessel/978-0-7020-6730-3>

<https://medlineplus.gov>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

توسط سوزن اتوماتیک انجام می شود. هنگام انجام نمونه برداری، سوزن بیوپسی صدای خفیفی ایجاد می کند که نگران کننده نیست، خونسردی خود را حفظ کرده و آرام باشید. برای به دست آوردن نمونه مناسب ممکن است این کار چند نوبت تکرار شود. بعد از نمونه برداری، محل پانسمان شده و شما باید تا دو ساعت در همان حالت روی برانکارد بی حرکت بمانید.

مراقبت بعد از بیوپسی کلیه:

* به مدت ۴ تا ۶ ساعت بعد از عمل ناشتا باشید و پس از آن طبق دستور پزشک رژیم غذایی خود را با خوردن مایعات آغاز کنید.

* خوابیدن به شکم یا پشت توصیه می شود. (تحت فشار با کیسه شن)

* ۲۴ ساعت استراحت مطلق لازم است که حداقل ۳ ساعت تحت نظر در بیمارستان قرار می گیرید.

* علائم حیاتی شما کنترل می شود.

* کنترل خونریزی و سونوگرافی کنترل انجام می شود.

مراقبت در منزل:

* ۴۸ ساعت بعد از عمل پانسمان حفظ شود.

* استحمام ۴۸ ساعت بعد از عمل بلامانع است.

* برای کنترل درد از مسکن تجویز شده استفاده کنید.


* به مدت ۲۴ ساعت استراحت مطلق باشید.



مُدجوی گرامی:

با آرزوی سلامتی برای شما

این مطالب به منظور آشنایی با نمونه برداری از کلیه و مراقبت های لازم در مورد آن تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.



نمونه برداری از کلیه چیست؟

کار کلیه در بدن تنظیم فشار خون، دفع مواد زائد و مدیریت خونسازی است.

نمونه برداری روش تشخیص مهمی برای شناسایی علت بیماری کلیه است که با برداشتن نمونه کوچکی از کلیه از راه پوست، توسط سوزن با کمک سونوگرافی انجام می شود.

بررسی نمونه زیر میکروسکوپ تا حد زیادی به تشخیص علت بیماری کلیه کمک می کند و بدون تشخیص علت درگیری، درمان قطعی بیماری امکان پذیر نمی باشد.



آمادگی های لازم قبل از نمونه برداری:

* روز قبل از مراجعه استحمام کرده و موهای ناحیه پشت تمیز و تراشیده شود.

* جواب آزمایشات و تمامی مدارک پزشکی را همراه داشته باشید.

* داروهای فشارخون خود را طبق روال عادی مصرف کنید.

* در صورت دیابتی بودن، صبح روز عمل انسولین مصرف نکنید.

* در صورت داشتن هر گونه حساسیت پزشک را مطلع سازید.

* به منظور بررسی لخته شدن خون ممکن است نیاز به انجام یک آزمایش خون در روز نمونه برداری باشد.

* برای انجام اقدامات پذیرش، ترخیص و رساندن نمونه به آزمایشگاه یک نفر که بتواند به شما کمک کند، همراهتان باشد.

* چند روز قبل از انجام نمونه برداری (بیوپسی) درباره ادامه یا قطع مصرف داروهای آسپرین، ایبوپروفن، ایندومتاسین، وارفارین و اسویکس (تیکلوپیدین) با پزشک خود مشورت کنید.

* آزمایشات درخواست شده توسط پزشک را انجام دهید.

* ۶ ساعت قبل از مراجعه، مصرف غذا و مایعات را قطع کنید و ناشتا باشید.



آمادگی قبل از ورود به بخش اتاق عمل

اینترنشنال:

۱. پوشیدن لباس اتاق عمل و خارج کردن زیورآلات، دندان مصنوعی و عینک سپس تحویل مدارک پزشکی به اتاق عمل
۲- در صورت احتیاج به سرویس بهداشتی، ابتدا این نیاز برطرف شود زیرا مدت نسبتاً طولانی نمی توانید از تخت بلند شوید.

۳- امضای فرم رضایت نامه آگاهانه توسط بیمار (در صورت عدم هوشیاری بیمار، توسط همراهی انجام می شود)

روش انجام بیوپسی کلیه با دستگاه سونوگرافی:

- قبل از انجام بیوپسی کلیه، یک آنژیوکت در رگ محیطی دست شما تعبیه می شود. سپس به اتاق انجام نمونه برداری منتقل می شوید.

- شما باید روی برانکارد برروی شکم دراز بکشید و بالشی زیر شکمتان قرار می گیرد (در صورت نمونه برداری از کلیه پیوندی به پشت دراز می کشید) و پس از تعیین محل کلیه با سونوگرافی، پوست محل نمونه گیری با بتادین ضدعفونی و با آمپول لیدوکائین به صورت موضعی بی حس می شود.

- روی پوست شما برش کوچکی ایجاد می شود. نمونه گیری

