




مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

## نمونه برداری از پانکراس (لوزالمعده)



### ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۰۸-۱۰۰۲

شماره بازنگری: ۰۲

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش اینترنتونشال رادیولوژی - واحد آموزش سلامت

\* تا دو هفته خصوصا در اطفال از انجام این ورزش ها خودداری کنید: ورزش های رزمی، ژیمناستیک، شنا، دوچرخه سواری، فوتبال، اسکی و...

### در این موارد سریعا به پزشک و اولین مرکز درمانی مراجعه شود:

\* خونریزی یا ترشحات از محل نمونه برداری

\* تپش قلب

\* درد شدید

\* احساس تنگی نفس

\* تهوع و استفراغ مکرر

\* سرگیجه

\* تب بالا

\* ضعف

### منابع:

<https://www.elsevier.com/books/interventional-radiology-a-survival-guide/kessel/978-0-7020-6730-3>

<https://medlineplus.gov>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)  
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: [emamreza.mums.ac.ir](http://emamreza.mums.ac.ir)

۷- به توضیحات پزشک در حین انجام کار توجه کنید، آرام باشید و اضطراب نداشته باشید.

۸- گرفتن نمونه بیوپسی بوسیله سوزن مخصوص توسط پزشک انجام می شود و باید چند لحظه نفس عمیق نکشید.

۹- ممکن است بیشتر از یکبار نیاز به انجام نمونه برداری باشد.

۱۰- محل نمونه برداری پانسمان می شود و نیاز به بخیه ندارد. خوابیدن به پشت توصیه می شود.

### مراقبت بعد از نمونه برداری پانکراس:

\* به مدت ۴ تا ۶ ساعت بعد از عمل ناشتا باشید و پس از آن طبق دستور پزشک رژیم غذایی خود را با خوردن مایعات آغاز کنید.

\* خوابیدن به پشت توصیه می شود.

\* ۲۴ ساعت استراحت مطلق لازم است که حداقل ۳ ساعت تحت نظر در بیمارستان قرار می گیرید.

\* علائم حیاتی شما کنترل می شود.

\* کنترل خونریزی و سونوگرافی کنترل انجام می شود.

### مراقبت در منزل:

\* ۴۸ ساعت بعد از عمل پانسمان حفظ شود.

\* استحمام ۴۸ ساعت بعد از عمل بلامانع است.


\* برای کنترل درد از مسکن تجویز شده استفاده کنید.

\* به مدت ۲۴ ساعت استرا

## ممدجوى گرامى:

با آرزوى سلامتى براى شما

اين مطالب به منظور آشنائى با نمونه بردارى از پانكراس و مراقبت هاى لازم در مورد آن تهيه شده است. اميد است با مطالعه آن قادر باشيد دوره درمان خود را به خوبى مديريت نماييد.



## نمونه بردارى يا بيوپسى پانكراس چيست؟

پانكراس يا لوزالمعده از دو غده درون ريز و برون ريز تشكيل شده است كه با هم به يك عضو متصل مى شوند و داراى دو عملکرد اصلى، هضم و تنظيم قند خون است.

بىوپسى پانكراس يعنى برداشتن اندازه كوچكى از بافت پانكراس كه بوسيله سوزن مخصوص انجام مى شود و هدف از آن، بررسى وضعيت سلول هاى پانكراس و كسب اطلاعات ارزشمندى براى تعيين مرحله بيمارى ( شدت التهاب و آسيب سلول ها)، پيش آگهى و همچنين كمك به انتخاب بهترين روش درمانى و مديريت بيمارى در اختيار پزشك معالج قرار مى دهد.



## آمادگى قبل از بيوپسى پانكراس:

- ۱- مشورت با پزشك خود و قطع داروهايى مانند: آسپرین، ايبوپروفن، ايندومتاسين، وارفارين و اسويكس (تيكلوپيدین) چند روز قبل از انجام نمونه بردارى يا بيوپسى
- ۲- انجام آزمایشات درخواست شده توسط پزشك
- ۳- تميز نمودن و زدودن موهاى قسمت فوقانى شکم
- ۴- مصرف غذا و مايعات ۶ ساعت قبل از مراجعه
- ۵- استحمام شب قبل از مراجعه
- ۶- همراه داشتن همه مدارك پزشكى
- ۷- مصرف داروهاى فشارخون مثل قبل
- ۸- عدم مصرف انسولين، صبح روز عمل در بيماران ديابتيك
- ۹- اطلاع به پزشك در صورت داشتن هر گونه حساسيت
- ۱۰- داشتن همراهى براى اقدامات پذيرش، ترخيص و رساندن نمونه به آزمايشگاه

## آمادگى قبل از ورود به بخش اتاق عمل اينترونشال:

- ۱- پوشيدن لباس اتاق عمل و خارج كردن زيربوت، دندان مصنوعى و عيّنك و سپس تحويل مدارك به اتاق عمل
- ۲- در صورت احتياج به سرويس بهداشتى، ابتدا اين نياز برطرف شود زيرا مدت نسبتا طولانى نمى توانيد از تخت بلند شويد.



- ۳- امضاى فرم رضایت نامه آگاهانه توسط بيمار (در صورت عدم هوشيارى بيمار، توسط همراهى انجام شود)

## روش انجام بيوپسى پانكراس با دستگاه سونوگرافى:

- ۱- علائم حياتى شما (فشارخون - نبض - تنفس - درجه حرارت) كنترل مى شود. لطفا در صورتى كه مشكل جسمى داريد اطلاع دهيد.
- ۲- انجام معاينه اوليه و علامتگذارى محل بيوپسى انجام مى شود.
- ۳- تعبیه آنژیوكت در يکى از رگ هاى محيطى دست و در صورت لزوم از آن براى دادن دارو و يا سرم استفاده مى شود.
- ۴- شما بايد به پشت بخوابيد و شستشوى محل با بتادين انجام مى شود.
- ۵- تزريق بى حسى موضعى به زير پوست در ناحيه محل نمونه گيرى انجام مى شود و بعد از گذشت ۲ الى ۳ دقيقه دردى احساس نمى كنيد و فقط كمى فشار را در حين انجام كار احساس مى كنيد.
- ۶- يك برش كوچك روى پوست ايجاد مى شود.

