




مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

نمونه برداری از پستان تحت هدایت سونوگرافی



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۰۸-۱۰۰۴

شماره بازنگری: ۰۲

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش اینترنتونشال رادیولوژی - واحد آموزش سلامت

۲- جهت کنترل خونریزی، به مدت ۱ تا ۲ ساعت در بخش حضور دارید.

۳- علائم حیاتی شما کنترل می شود و تحت نظر قرار می گیرید.

۴- خونریزی محل عمل کنترل می شود.

۵- برای کنترل درد از مسکن تجویز شده استفاده کنید.

مراقبت در منزل:

انجام این روش بسیار بی خطر است ولی در موارد کمی خونریزی در محل ورود سوزن روی می دهد که معمولاً ایجاد درد، کبودی و تورم کمی می کند. درد و تورم باید بعد از ۴۸ ساعت به حداقل برسد. در صورت بروز درد شدید، تورم و یا کبودی وسیع به پزشک مراجعه نمایید.

منابع:

<https://www.elsevier.com/books/interventional-radiology-a-survival-guide/kessel/978-0-7020-6730-3>

<https://medlineplus.gov>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

می شود. با کمک سوزن ظرف چند ثانیه تکه کوچکی از ضایعه

پستان به عنوان نمونه بر داشته می شود.

- ممکن است عبور دادن سوزن و نمونه برداری چند بار تکرار شود تا نمونه کافی بدست آید. سپس محل نمونه برداری پانسمان می شود. نیازی به بخیه کردن محل ورود سوزن نیست.

در هنگام برداشتن سلولها با سوزن، چندین احتمال زیر ممکن است رخ دهد:

* ممکن است در داخل توده مایع باشد که توسط سوزن این مایع کشیده و توده ناپدید می گردد. این وضعیت نشان می دهد که توده احتمالاً یک کیست ساده است و معمولاً نیاز به درمان بیشتری ندارد.

* ممکن است سلولهایی که از توده کشیده می شود سلولهای خوش خیمی باشد، در اینصورت شما سرطان پستان ندارید.

- نکته: اگر سلولهای بدست آمده نشانگر بدخیمی باشد، باید هرچه سریعتر عمل جراحی انجام پذیرد.

* در برخی موارد لازم است که مجدداً در روز دیگری نمونه برداری تکرار شود. نمونه بدست آمده در شیشه حاوی محلول مخصوص (فرمالین) قرار داده شود به آزمایشگاه آماده می شود.

مراقبت بعد از نمونه برداری بیوپسی پستان:

۱- بعد از نمونه برداری، ناحیه انجام عمل پانسمان می شود.



مددجوی گرامی:

با آرزوی سلامتی برای شما

این مطالب به منظور آشنایی با نمونه برداری از پستان و مراقبت های لازم در مورد آن تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.



نمونه برداری سوزنی از پستان چیست؟

سرطان سینه شایعترین نوع سرطان در بین زنان ایرانی است و متأسفانه سن ابتلا به این بیماری در کشور ما پایین تر از سایر کشورهای دنیا می باشد. عده قابل توجهی از زنان جوان در سنین باروری ممکن است به دنبال بیماریهای پستان از جمله توده های پستانی، برآمدگی و درد پستان با احتمال خطر ابتلا به کانسر پستان، دچار اضطراب و نگرانی شوند. لذا افتراق انواع خوش خیم و بدخیم این مشکلات پستانی بسیار مهم است. در صورت وجود توده ای در پستان بعد از معاینه دقیق و روش های تصویربرداری مناسب اقدام بعدی جهت بدست آوردن سلولهایی از بافت ضایعه مشکوک یعنی نمونه برداری از ضایعه مشکوک جهت بررسی آسیب شناسی خواهد بود.



یکی از قابل استفاده ترین روشهای بیوپسی (نمونه برداری)، بیوپسی تحت هدایت سونوگرافی بخصوص در مورد توده های غیر قابل لمس پستانی می باشد.

یکی از قابل استفاده ترین روشهای بیوپسی (نمونه برداری)، بیوپسی تحت هدایت سونوگرافی بخصوص در مورد توده های غیر قابل لمس پستانی می باشد.

آمادگی های لازم قبل از نمونه برداری:

* جواب آزمایشات و تمامی مدارک پزشکی را همراه داشته باشید.

* داروهای فشارخون خود را طبق روال عادی مصرف کنید.

* در صورت دیابتی بودن، صبح روز عمل انسولین مصرف نکنید.

* در صورت داشتن هر گونه حساسیت، پزشک را مطلع سازید.

* برای انجام اقدامات پذیرش، ترخیص و رساندن نمونه به آزمایشگاه یک نفر که بتواند به شما کمک کند، همراهتان باشد.

* چند روز قبل از انجام نمونه برداری (بیوپسی) درباره ادامه یا قطع مصرف داروهای آسپرین، ایبوپروفن، ایندومتاسین، وارفارین و اسویکس (تیکلوپیدین) با پزشک خود مشورت کنید.

* آزمایشات درخواست شده توسط پزشک را حتما انجام دهید.



آمادگی قبل از ورود به بخش اتاق عمل اینترنشنال:

۱. پوشیدن لباس اتاق عمل و خارج کردن زیورآلات، دندان مصنوعی و عینک سپس تحویل مدارک پزشکی به اتاق عمل
۲- در صورت احتیاج به سرویس بهداشتی، ابتدا این نیاز برطرف شود زیرا مدت نسبتاً طولانی نمی توانید از تخت بلند شوید.

۳- امضای فرم رضایت نامه آگاهانه توسط بیمار (در صورت عدم هوشیاری بیمار، توسط همراهی انجام شود)

روش نمونه برداری از پستان با هدایت سونوگرافی:

- قبل از انجام بیوپسی پستان، یک آنژیوکت در رگ محیطی دست شما تعبیه می شود تا در صورت لزوم از آن برای دادن دارو یا سرم استفاده شود.

- علائم حیاتی شما (فشار خون، نبض، تنفس، درجه حرارت) کنترل می شود. سپس به اتاق انجام نمونه برداری منتقل می شوید. شما روی برانکارد به پشت دراز می کشید و با بتادین محل نمونه برداری ضدعفونی می شود.

- با یک سوزن بسیار نازک، ماده بیحس کننده موضعی داخل پوست شما در محل نمونه برداری تزریق می شود. ممکن است شما سوزش ورود این سوزن را احساس کنید اما پس از آن، درد نخواهید داشت.

- پزشک محل ورود سوزن نمونه برداری را با یک تیغ خیلی ظریف باز کرده و سپس سوزن نمونه برداری با هدایت سونوگرافی از پوست به سمت ضایعه پستان عبور داده

