




مراقبت از پورت



ویژه: بیماران


تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۰۸-۱۰۱۲

شماره بازنگری: ۰۱

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش ایترنوشال رادیولوژی - واحد آموزش سلامت

- برگشت خون ندارد و مسدود است.

- قرمزی پوست اطراف گردن، تورم، درد، بالارفتن درجه حرارت بدن، لرز، ضعف، سرگیجه، ترشحات چرکی یا استشمام بوی بد از محل برش که احتمال نشانه های عفونت پورت است.

- تورم، قرمزی و درد در محل پورت یا اطراف آن یا در گردن که احتمال نشانه های لخته شدن و انسداد پورت است.

منابع:

<https://bloodjournal.ir/browse>

<https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate>

<https://medlineplus.gov>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت **رایگان** همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

مراقبت از محل جراحی پس از پورت گذاری:

* محل برش با یک پانسمان کوچک یا چسب مخصوص جراحی پوشانده می شود.

* ۲۴ ساعت پس از عمل پانسمان محل پورت برداشته شود و موضع عمل تمیز و خشک نگهداری شود.

* محل برش برای ۱ تا ۲ روز ممکن است دردناک باشد که می توان از داروهای ضددرد استفاده کرد.

* محل برش نباید مرطوب بماند، در هنگام استحمام از پانسمان ضد آب استفاده شود.

* در صورتی که از نخ غیر قابل جذب جهت بخیه های محل برش استفاده شده باشد، طی ۱۰ تا ۱۴ روز پس از عمل جراحی کشیده می شوند.

* پس از پورت گذاری به مدت ۵ روز آنتی بیوتیک های خوراکی جهت جلوگیری از عفونت تجویز می شود.

هشدار:

در صورت مشاهده این موارد باید به پزشک خود مراجعه کنید:

- پورت شما شست و شو نشده است.



ممدجوی گرامی:

با آرزوی سلامتی برای شما

این مطالب به منظور آشنایی با پورت و مراقبت‌های لازم در مورد آن تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

پورت چیست؟

پورت وسیله ای دایره ای شکل بوده که برای ایجاد یک راه ورودی مرکزی در زیر پوست جایگذاری می‌شود. پورت جهت تزریق وریدی دارو و سرم، تغذیه وریدی و نمونه گیری از خون به کار می‌رود. معمولی ترین مکان برای جایگذاری پورت، در فضای قفسه سینه و زیر استخوان ترقوه است ولی می‌تواند در بازوها، فضای شکم و ساق پاها نیز گذاشته شود. پورت از طریق عمل جراحی و در اتاق عمل گذاشته می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده پورت:

پورت دارای دو بخش اصلی است:


۱- مخزن، یک صفحه دایره ای شکل است و یک سطح برآمده کوچک زیر پوست شما ایجاد می‌کند. مخزن قسمتی است که سرسوزن در آن قرار می‌گیرد.

۲- کاتتر، یک لوله بلند و باریک است که از مخزن منشأ می‌گیرد و در یک سیاهرگ بزرگ قرار داده می‌شود. دارویی که در مخزن تزریق می‌شود از طریق کاتتر وارد سیاهرگ می‌گردد.



استفاده از پورت چگونه انجام می‌شود؟

استفاده از پورت باید به روش استریل انجام شود. فقط سوزن مخصوص پورت برای این کار قابل استفاده است. ابتدا با مالیدن پماد بی حس کننده، پوست روی محل پورت بی‌حس می‌گردد، سپس سوزن مخصوص در محل مربوطه جای گذاری می‌شود. پس از آن برای اطمینان از قرارگیری مناسب سوزن در رگ و لخته نشدن آن باید برگشت خون چک شود. یک پانسمان شفاف روی محل گذاشته می‌شود و هفته ای یک بار یا هر بار پرستار الزام بداند سوزن تعویض می‌گردد. پانسمان باید تمیز و خشک بوده و از مرطوب ماندن آن جلوگیری شود. زمانی که از پورت استفاده نمی‌شود نیازی به قرار دادن پانسمان روی آن نیست.



شست و شوی پورت:

شست و شوی پورت از لخته شدن و انسداد آن جلوگیری می‌کند. اگر تزریق مداوم دارو یا سرم جریان دارد نیازی به شست و شوی نیست اما اگر تزریق دارو به طور متناوب انجام می‌گیرد یا اگر از پورت استفاده نمی‌شود، باید هر هفته یک بار پورت شست و شو داده شود. شست و شوی پورت معمولاً با سرم نمکی و هیپارین انجام می‌شود. به راهنمایی‌های پرستار خود در مورد اینکه چه زمانی، چقدر و چه نوع شست و شو برای شما لازم است، عمل نمایید.

نکته مهم:

اگر به هیپارین حساسیت دارید به پرستار خود اعلام نمایید.

خارج کردن پورت:

برای خارج کردن پورت روش جراحی مورد نیاز است که مشابه همان روش گذاشتن آن می‌باشد.

