



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

عفونت و روش های پیشگیری از ایجاد عفونت در دیالیز صفاقی



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۵۶-۱۰۰۳




شماره بازنگری: ۰۱

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش دیالیز صفاقی - واحد آموزش سلامت



منابع:

- کتاب دیالیز صفاقی - فرزانه شریفی پور و مهناز هیهات - ۱۳۹۷

<https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate>

<https://www.clinicalkey.com>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت **رایگان** همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

در صورت مشاهده نشت مایع از محل

خروج کاتتر چه اقداماتی باید انجام دهید؟

اگر از اطراف محل خروج کاتتر شما مایع خارج می شود، تعویض دیگری انجام ندهید. در صورت خیس و آلوده بودن پانسمان آن را تعویض نمایید و فوراً با واحد دیالیز صفاقی تماس بگیرید.

در صورت مشاهده خون در کیسه تخلیه چه

اقداماتی باید انجام دهید؟

اگر در کیسه تخلیه، خون مشاهده می کنید، نگران نباشید. گاهی پس از تمرینات ورزشی این اتفاق می افتد و منجر به صورتی رنگ شدن محتویات کیسه می گردد. خانم ها در زمان قاعدگی ممکن است خون در کیسه مشاهده کنند. در صورت مشاهده خون در کیسه خروجی حتماً با پرستار خود تماس بگیرید.



ممدجوى گرامى:

اين مطالب به منظور آشنائى با عفونت و روش‌هاى پيشگيرى از عفونت در دياليز صفاقى و مراقبت‌هاى لازم بعد از آن تهيه شده است. اميد است با مطالعه آن قادر باشيد دوره درمان خود را به خوبى مديريت نماييد.

پريتونيت (التهاب صفاق) چيست؟

پريتونيت به التهاب پرده صفاق گفته مى شود كه عمدتاً توسط عفونت ايجاد مى گردد. در صورت بروز پريتونيت، محتويات كيسه تخليه كدر مى شود.

همچنين علائم زير ممكن است ديده شوند:

* دل درد

* تهوع و استفراغ

* دماى بالاي بدن (تب)

* كدر بودن محلول خروجى دياليز صفاقى

* اسهال يا يبوست



در صورت وجود عفونت محل خروج كاتتر چه

علائمى را مشاهده خواهيد كرد؟

* درد و حساسيت هنگام لمس

* قرمزى، تورم و گرم شدن پوست در محل خروج كاتتر

توصيه مى شود در صورت مشاهده اين علائم با واحد دياليز صفاقى تماس بگيريد.

توصيه هاى خود مراقبتى جهت پيشگيرى از

عفونت شامل چه مواردى مى شود؟

- دست هايتان را كاملاً بشوييد.

- سطحى را كه قرار است دياليز را بر روى آن انجام دهيد، تميز نگه داريد.

- به محل اتصالات لوله ها دست نزنيد.

- بر روى اتصالات عطسه و سرفه نكنيد.

- محل خروج كاتتر را تميز نگه داريد و كاتتر را با يك تكه چسب بر روى شكم ثابت نماييد.



در صورت مشاهده آلودگى مسير لوله چه

اقداماتى بايد انجام دهيد؟

اگر به طور تصادفى مسير لوله آلوده شود. عمل تعويض را بلافاصله قطع كنيد. (درپوش) را روى لوله قرار دهيد و بلافاصله با واحد دياليز صفاقى تماس بگيريد.

در صورت مشاهده پارگى يا سوراخ شدگى در

مسير لوله چه اقداماتى بايد انجام دهيد؟

اگر پارگى يا سوراخ شدگى در مسير لوله مشاهده كرديد، ۲ الى ۳ سانتى متر بالاتر از سوراخ شدگى يك گاز و روى آن يك گيره بگذاريد و بلافاصله به واحد دياليز صفاقى تماس بگيريد.

در صورت جدا شدن لوله از كاتتر چه

اقداماتى بايد انجام دهيد؟

اگر لوله از كاتتر جدا شده است، يك گاز روى كاتتر گذاشته و روى آن يك گيره بنيد و فوراً با واحد دياليز صفاقى تماس بگيريد.

