



* مصرف مداوم دارو ایجاد وابستگی می کند و ترک خودسرانه هم عوارض خطرناکی بدنبال دارد؛ ترک دارو حتما باید تحت نظر پزشک انجام شود.

* بایستی دقت شود که تمام موارد استفاده مداوم از این دارو به معنای سوءمصرف دارو است.



* در بیماران با مسمومیت ترامادول احتمال آسیب به کلیه ها وجود دارد بنابراین سرم درمانی جهت افزایش دفع ادراری انجام می شود.

رژیم غذایی مجاز و غیر مجاز:

تازمان هوشیاری کامل از دادن هر گونه ماده غذایی به بیمار خودداری شود و بیمار ناشتا می شود و پس از پایدار شدن وضعیت بیمار رژیم معمولی با مایعات فراوان توصیه می گردد.

آموزش های خود مراقبتی:

* از مصرف ترامادول و سایر داروها بدون تجویز پزشک خودداری شود.

* به نوجوانان آموزش داده شود که از پذیرفتن قرص های مختلف در مدارس و سایر مکان ها از اشخاص غریبه و دوستان امتناع کنند.

* مراقبت و کمک های روان شناسی به نوجوانان توصیه میشود.



* از پیامدهای دراز مدت مصرف این دارو میتوان به روان پریشی و اختلالات مغزی، اختلالات شخصیتی، ناتوانی در تصمیم گیری، عدم تعادل در راه رفتن و خشکی دهان اشاره کرد.



مسمومیت با قرص ترامادول



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۴۹-۱۰۰۶

شماره بازنگری: ۰۵

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش مسمومین- واحد آموزش سلامت

منابع:

کتاب سم شناسی بالینی و درمان های اورژانس های مسمومین ۱۴۰۱

کتاب اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۲۲

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir


مسمومیت با داروی ترامادول چگونه درمان

میشود؟

* در صورت شک به مسمومیت با ترامادول، باید بیمار را به اولین اورژانس در دسترس و ترجیحا دارای بخش مسمومین رساند.

* در صورتی که در یک ساعت اول پس از مصرف فرد به مرکز درمانی مراجعه کرده است و ممنوعیتی وجود نداشته باشد، شستشو معده انجام میشود. اگر فرد در ۴ ساعت اول پس از مصرف دارو مراجعه کرده و شرایط پایداری دارد زغال فعال تجویز می شود.

* درمانهای حمایتی شامل سرم تراپی، اکسیژن تراپی و مانیتورینگ قلبی و پالس اکسی متری تا هوشیار شدن بیمار و ثابت شدن علائم حیاتی ادامه می یابد.



* انجام مشاوره های روانشناسی در مسمومیت های عمدی برای کمک به مددجو انجام می گردد.

* با توجه به احتمال بروز تشنج (در ۲۴ ساعت اول) بایستی فرد حداقل به مدت ۲۴ ساعت بستری و تحت نظر باشد.



علائم مسمومیت با داروی ترامادول کدام اند؟



* تهوع شدید

* سرگیجه

* خواب آلودگی

* خشکی دهان

* یبوست

* افت فشارخون

* تعریق

* خارش بدن

* تشنج

چه عواملی باعث تشدید مسمومیت می شوند؟

* مصرف همزمان دارو با دیگر داروهای آرامبخش و مخدرها

مسمومیت با داروی ترامادول چگونه تشخیص داده

می شود؟

* آزمایش نمونه ادراری و سم شناسی دارو

* آزمایش خون و تست عملکرد کلیه

* گرفتن نوار قلب



مددجوی گرامی

با آرزوی سلامتی برای شما

این مطالب به منظور آشنایی با مسمومیت با ترامادول و مراقبت های لازم در مورد آن تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید

داروی ترامادول چیست؟

ترامادول یک داروی ضد درد مخدر است که برای تسکین دردهای متوسط تا شدید تجویز می شود.

این دارو تاثیر ضعیف تر از مورفین و قوی تر از مسکن های نظیر بروفن و استامینوفن دارد و پس از مصرف خوراکی به سرعت جذب می شود و اثر آن در حالت خوراکی پس از ۲ تا ۳ ساعت به حداکثر می رسد و تا ۶ ساعت ادامه دارد.

ترامادول در بازار دارویی ایران به صورت قرص و کپسول ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم و آمپول ۱۰۰ میلی گرم وجود دارد.

در صورت مصرف بیش از حد این دارو مسمومیت اتفاق می افتد.

