



آمادگی بیماران بستری جهت بیوپسی پلور:



تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ کد پمفلت: PA-۰۵-۱۰۱۰ شماره بازنگری: ۰۱

- ❖ بیمار حتماً صبحانه خورده باشد.
- ❖ تست PCR منفی همراه داشته باشد (در دوران پیک کرونا طبق دستور پزشک)
- ❖ گرافی های ریه را حتماً همراه داشته باشد.
- ❖ همراه بیمار جهت اخذ رضایت با بیمار به برونکوسکوپی فرستاده شود.
- ❖ داروی وارفارین حداقل ۵ روز قبل قطع باشد و $INR \leq 1.5$ باشد.
- ❖ آمپول انوکسپارین حداقل ۱۲ تا ۲۴ ساعت قبل از پروسجر قطع شده باشد.
- ❖ در صورت دریافت هپارین زیرجلدی، یک دوز قبل از پروسجر قطع شده باشد.
- ❖ در صورت مصرف پلاویکس، بعد از هماهنگی با سرویس محترم قلب، پلاویکس ۳ تا ۵ روز قبل قطع شده باشد.
- ❖ دستورات داده شده در مشاوره ریه از قبیل مقدار پلاکت و کراتینین، آزمایشات انعقادی رعایت شده باشد.
- ❖ حضور پرستار هنگام ورود و خروج بیمار به برونکوسکوپی الزامی است.
- ❖ تاریخ انجام مشاوره:
- ❖ تاریخ درخواست نوبت از بخش برونکوسکوپی:
- ❖ تاریخ عمل:



آمادگی بیماران بستری جهت بیوپسی پلور:



تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ کد پمفلت: PA-۰۵-۱۰۱۰ شماره بازنگری: ۰۱

- ❖ بیمار حتماً صبحانه خورده باشد.
- ❖ تست PCR منفی همراه داشته باشد (در دوران پیک کرونا طبق دستور پزشک)
- ❖ گرافی های ریه را حتماً همراه داشته باشد.
- ❖ همراه بیمار جهت اخذ رضایت با بیمار به برونکوسکوپی فرستاده شود.
- ❖ داروی وارفارین حداقل ۵ روز قبل قطع باشد و $INR \leq 1.5$ باشد.
- ❖ آمپول انوکسپارین حداقل ۱۲ تا ۲۴ ساعت قبل از پروسجر قطع شده باشد.
- ❖ در صورت دریافت هپارین زیرجلدی، یک دوز قبل از پروسجر قطع شده باشد.
- ❖ در صورت مصرف پلاویکس، بعد از هماهنگی با سرویس محترم قلب، پلاویکس ۳ تا ۵ روز قبل قطع شده باشد.
- ❖ دستورات داده شده در مشاوره ریه از قبیل مقدار پلاکت و کراتینین، آزمایشات انعقادی رعایت شده باشد.
- ❖ حضور پرستار هنگام ورود و خروج بیمار به برونکوسکوپی الزامی است.
- ❖ تاریخ انجام مشاوره:
- ❖ تاریخ درخواست نوبت از بخش برونکوسکوپی:
- ❖ تاریخ عمل: