



آمادگی های لازم جهت برونکوسکوپي بیماران بستری:



تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ کد پمفلت: PA-۰۵-۱۰۱۱ شماره بازنگری: ۰۱

- ❖ بیمار حتماً از ۶ ساعت قبل ناشتا باشد.
- ❖ تمام آزمایشات، عکس ها و سی تی اسکن ریه همراه بیمار ارسال شود.
- ❖ حضور پرستار با بیمار هنگام ورود و خروج به بخش برونکوسکوپي الزامی است.
- ❖ جهت اخذ رضایت آگاهانه، لطفاً همراهی بیمار به بخش برونکوسکوپي راهنمایی شود.
- ❖ برگه شماره ۷ (آمادگی قبل از عمل) و فرم درخواست برونکوسکوپي تکمیل و ضمیمه باشد.
- ❖ تست PCR کووید منفی (در دوران پیک کرونا طبق صلاحدید پزشک) همراه داشته باشد.
- ❖ حتماً شست شوی بینی با سرم نمکی یا آب نمک رقیق شده صبح روز برونکوسکوپي انجام شود.
- ❖ در صورتی که پزشک محترم ریه مشورت قلب یا اکو درخواست کرده اند، حتماً همراه باشد.
- ❖ در صورت نیاز به استفاده از داروی ضد فشارخون در صبح روز مراجعه، با مقدار بسیار کمی آب مصرف شود.
- ❖ در صورت سابقه همودیالیز روتین، حتماً روز قبل از برنکو دیالیز شود.
- ❖ مدت زمان قطع داروی ضد انعقاد قبل از برنکوسکوپي:
- ❖ وارفارین حداقل ۵ روز قبل قطع باشد و $INR \leq 2$ باشد.
- ❖ ریوارکسابان/آپیکسابان از ۲۴ تا ۴۸ ساعت قطع شود.
- ❖ انوکسپارین ۲۴ ساعت قبل از پروسیجر قطع شده باشد.
- ❖ هپارین زیرجلدی ۶ ساعت قبل از پروسیجر دریافت نشود.
- ❖ انفوزیون هپارین از ۶ ساعت قبل متوقف شود.
- ❖ در صورت مصرف پلاویکس، بعد از هماهنگی با سرویس محترم قلب پلاویکس ۵ روز قبل از برنکو قطع شده باشد.
- ❖ تاریخ انجام مشاوره:
- ❖ تاریخ درخواست نوبت پروسیجر از بخش برونکوسکوپي:
- ❖ تاریخ روز عمل:



آمادگی های لازم جهت برونکوسکوپي بیماران بستری:



تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ کد پمفلت: PA-۰۵-۱۰۱۱ شماره بازنگری: ۰۱

- ❖ بیمار حتماً از ۶ ساعت قبل ناشتا باشد.
- ❖ تمام آزمایشات، عکس ها و سی تی اسکن ریه همراه بیمار ارسال شود.
- ❖ حضور پرستار با بیمار هنگام ورود و خروج به بخش برونکوسکوپي الزامی است.
- ❖ جهت اخذ رضایت آگاهانه، لطفاً همراهی بیمار به بخش برونکوسکوپي راهنمایی شود.
- ❖ برگه شماره ۷ (آمادگی قبل از عمل) و فرم درخواست برونکوسکوپي تکمیل و ضمیمه باشد.
- ❖ تست PCR کووید منفی (در دوران پیک کرونا طبق صلاحدید پزشک) همراه داشته باشد.
- ❖ حتماً شست شوی بینی با سرم نمکی یا آب نمک رقیق شده صبح روز برونکوسکوپي انجام شود.
- ❖ در صورتی که پزشک محترم ریه مشورت قلب یا اکو درخواست کرده اند، حتماً همراه باشد.
- ❖ در صورت نیاز به استفاده از داروی ضد فشارخون در صبح روز مراجعه، با مقدار بسیار کمی آب مصرف شود.
- ❖ در صورت سابقه همودیالیز روتین، حتماً روز قبل از برنکو دیالیز شود.
- ❖ مدت زمان قطع داروی ضد انعقاد قبل از برنکوسکوپي:
- ❖ وارفارین حداقل ۵ روز قبل قطع باشد و $INR \leq 2$ باشد.
- ❖ ریوارکسابان/آپیکسابان از ۲۴ تا ۴۸ ساعت قطع شود.
- ❖ انوکسپارین ۲۴ ساعت قبل از پروسیجر قطع شده باشد.
- ❖ هپارین زیرجلدی ۶ ساعت قبل از پروسیجر دریافت نشود.
- ❖ انفوزیون هپارین از ۶ ساعت قبل متوقف شود.
- ❖ در صورت مصرف پلاویکس، بعد از هماهنگی با سرویس محترم قلب پلاویکس ۵ روز قبل از برنکو قطع شده باشد.
- ❖ تاریخ انجام مشاوره:
- ❖ تاریخ درخواست نوبت پروسیجر از بخش برونکوسکوپي:
- ❖ تاریخ روز عمل: