



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

برونکوسکوپي چیست؟



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۰۵-۱۰۱۷


شماره بازنگری: ۰۴

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش کلینیک تنفس - واحد آموزش سلامت



منابع:

کتاب بیماری‌های داخلی، جراحی. (تنفس - برونر) - ۲۰۲۲

<https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

* ۳ ساعت پس از برونکوسکوپي چیزی نخورید.

* بهتر است برای شروع خوردن از مایعات (به جز آبمیوه‌های قرمز رنگ) استفاده کنید.

* اگر از ریه شما نمونه برداری شده است باید توسط همراهتان به آزمایشگاه مربوطه فرستاده شود.

* در افرادی که به صورت سرپایی مراجعه می کنند نمونه توسط همراه بیمار به آزمایشگاه و پاتولوژی برده می شود.

* بروز تب خفیف، گرفتگی صدا، سرفه، تنگی نفس خفیف و دفع رگه‌های خونی در خلط معمولی است.

در صورت بروز چه نشانه هایی بعد از انجام برونکوسکوپي باید به پزشک مراجعه کنید؟


* خونریزی شدید (بیشتر از نصف استکان)، بی قراری، کاهش فشار خون و افزایش ضربان قلب

* کبود شدن نوک انگشتان و لب ها، تنگی نفس و نامنظم شدن ضربان قلب

* درد قفسه سینه

* در صورت بروز تب در شب اول بعد از برونکوسکوپي طبق دستور پزشک می توانید از قرص استامینوفن هر ۶ ساعت استفاده کنید. در صورت ادامه تب حتما به پزشک یا اورژانس مراجعه کنید.





مددجوی گرامی:

با آرزوی سلامتی برای شما

این مطالب به منظور آشنایی با اقدام برونکوسکوپی تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

برونکوسکوپی چیست؟

برونکوسکوپی اقدام تشخیصی و گاهی درمانی است.

لوله دستگاه برونکوسکوپ از بینی و دهان وارد نای و راههای هوایی شده و از طریق آن پزشک قادر به مشاهده مستقیم داخل مجاری هوایی و سیستم تنفسی می باشد.

برونکوسکوپی هنگامی انجام می شود که پزشک بر اساس شرح حال، تاریخچه بیماری، عکس قفسه سینه و یا سی تی اسکن نیاز به تشخیص قطعی جهت نوع بیماری شما داشته باشد.



داشتن مدارک زیر جهت انجام برونکوسکوپی در بیماران سرپایی الزامی است:

* دستور پزشک فوق تخصص ریه بیمارستان جهت انجام برونکوسکوپی

* گرافی قفسه سینه

* جواب منفی سه نوبت اسمیر خلط از نظر باسیل سل طبق نظر پزشک و به همراه داشتن آزمایشات ضروری است.

* برای بیماران بالای ۵۰ سال داشتن نوار قلب الزامی است.

چه مواردی را قبل از انجام برونکوسکوپی باید رعایت کرد؟

* قبل از انجام برونکوسکوپی باید برگه رضایت عمل را با دقت خوانده و سپس امضا نمایید.

* داشتن یک نفر همراه الزامی است.

* از ۸ ساعت قبل از انجام برونکوسکوپی باید ناشتا باشید.

* در صورت داشتن دندان مصنوعی، لنزهای چشمی و زیورآلات آنها را خارج نمایید.

* در صورت داشتن هر گونه حساسیت دارویی به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید.



* در صورتی که داروهای خاصی مصرف می کنید مانند داروی ضدانعقاد شامل (آسپرین، پلاویکس، وارفارین و ریوارکسaban)، داروی قلبی، داروی فشارخون و قندخون به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید. قبل از انجام برونکوسکوپی با آب ولرم دهان و بینی خود را بشویید.

روش انجام برونکوسکوپی چگونه است؟

* داروی بی حسی موضعی به صورت اسپری در دهان شما استفاده می شود.

* در حین برونکوسکوپی باید از طریق بینی و یا دهان نفس بکشید.

* اکسیژن از طریق سوند بینی یا ماسک برای شما گذاشته می شود.

* از دستگاهی به اسم پالس اکسی متر جهت اندازه گیری میزان اکسیژن خون شما استفاده می شود که به صورت گیره به نوک انگشت متصل می شود.

* مددجوی عزیز لطفا همکاری لازم را در هنگام انجام برونکوسکوپی با پزشک و پرستار خود داشته باشید.

* موارد زیر را بعد از انجام برونکوسکوپی رعایت کنید:

* تمامی بیمارانی که پس از برونکوسکوپی به مدت حداقل نیم ساعت در بخش برونکوسکوپی تحت نظر می مانند.

