




کیست هیداتیک ریه



ویژه: بیماران و همراهیان

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۳/۰۱

کد پمفلت: PA-۵۵-۱۰۱۰

شماره بازنگری: ۰۰

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت
تهیه کننده: بخش ریه - واحد آموزش سلامت

توصیه های زمان ترخیص از بیمارستان:

* هنگام ترخیص و خروج از بخش حتما خلاصه پرونده و نسخه داروهای تجویز شده را دریافت کنید.

* در صورتیکه نمونه برداری حین عمل داشته اید، در خلاصه پرونده شما قید می شود و جواب آزمایش آسیب شناسی (پاتولوژی) شما حدود ۱۰ الی ۱۴ روز بعد از عمل جراحی آماده می شود، لطفا پیگیر جواب آزمایش باشید.

* زمان مراجعه بعدی به پزشک خود را جهت ادامه درمان فراموش نکنید.

* ۷ الی ۱۰ روز بعد از عمل جراحی جهت کشیدن بخیه ها به پزشک معالج خود، مراجعه کنید.

* تا ۲ هفته از بلند کردن اجسام سنگین و فعالیت سنگین پرهیز نمایید.

منابع:

پرستاری داخلی- جراحی برونر و سودارث ۲۰۲۲: تنفس و تبادلات گازی (انتشارات جامعه نگر)

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

کشیدن و بروز اختلال در تنفس و خس خس سینه اشاره کرد.

دفع بزاق شورمزه یا خلط خونی مختصر هم ممکن است در این بیماری مشاهده شود.

چگونه باید از ایجاد بیماری در انسان پیشگیری کرد؟

۱- رعایت بهداشت فردی و محیط

۲- مصرف سبزیجات شسته شده به روش صحیح و بهداشتی و یا استفاده از ۳ تا ۵ قطره مایع ظرفشویی در شستشو، شناور کردن سبزی به مدت ۵ دقیقه در کف آب

۳- مصرف آب تصفیه شده و ضد عفونی شده

۴- معاینات دوره ای سگ های صاحبدار و خانگی توسط دامپزشک

۵- ممانعت از ورود سگ به منطقه سبزیکاری

۶- رعایت اصول بهداشت فردی و نگهداری حیوانات خانگی در شرایط کنترل شده بهداشتی

۷- کشتار دام در کشتارگاه های بهداشتی

این بیماری چگونه تشخیص داده می شود؟

* معاینات فیزیکی * آزمایشات خون * تصویربرداری از ریه * سی تی اسکن * سونوگرافی

بیماری کیست هیداتیک چگونه درمان می شود؟

درمان این بیماری با عمل جراحی و داروهای مثل آلبندازول امکان پذیر است.



مددجوی گرامی:

با آرزوی سلامتی برای شما

این مطالب به منظور آشنایی با کیست هیداتیک ریه تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید، دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

کیست هیداتیک ریه چیست؟

کیست هیداتیک یکی از بیماری های انگلی مشترک بین انسان و حیوان است. انگل عامل این بیماری یک کرم کوچک پهن و بندبند است که طول آن ۳ تا ۵ میلی متر می باشد که به سختی با چشم دیده می شود.

کیست هیداتیک از جمله کیست های شایعی است که امکان رشد آن در هر عضو بدن وجود دارد و شایعترین عضوی که درگیر بیماری می شود کبد و ریه هستند.

کیست های ریوی معمولاً توده های گرد هستند و ضخامت بیشتر آن ها بین ۱ تا ۲۰ سانتی متر است.

ممکن است کیست های هیداتیک دارای سطح مایع هوا شوند که پس از پاره شدن و تخلیه، مایع داخل کیست خارج می شود.

میزبان های این انگل کدام اند؟

میزبان اصلی این کرم ها سگ سانان هستند و کرم در روده باریک سگ آلوده زندگی می کند. سگ سانان



آلوده از طریق مدفوع خود، تخم این کرم ها را در مزارع، مراتع و سبزی کاری ها پراکنده و باعث آلودگی محیط می شوند. اگر تخم این انگل توسط گاو، گوسفند، بز، شتر و یا انسان همراه با علوفه یا سبزی های خام شسته شده خورده شوند، جنینی که در این تخم ها وجود دارد، در روده آزاد شده و پس از نفوذ در بافت روده خود را توسط گردش خون به کبد، ریه، مغز، کلیه ها، استخوان و سایر بافتها می رساند و در آنجا کیسه هایی پر از مایع به اندازه یک توپ کوچک و گاهی بزرگ تشکیل می دهند، به این کیست ها کیست هیداتیک می گویند.

این بیماری چگونه انتقال پیدا می کند؟

۱- ذبح غیربهداشتی دام و نیز عدم نظارت صحیح در کشتارگاه ها جهت معدوم سازی امعاء و احشاء آلوده

۲- بیرون انداختن امعاء و احشاء آلوده به کیست

۳- قرار گرفتن این اندام ها در دسترس سگ و سگ سانان

۴- خوردن کیست ها توسط سگ و تشکیل کرم ها در روده سگ

۵- دفع تخم های متعدد توسط سگ در محیط




۶- خوردن علوفه و آب آلوده به تخم های دفع شده سگ توسط دام ها (گوسفند، گاو، بز و ...)

۷- تبدیل تخم ها به کیست هیداتیک در اعضای مختلف دام

۸- ذبح غیر بهداشتی دام و تکرار چرخه

۹- خوراندن داروی ضد انگل بدون سوزاندن یا دفع بهداشتی مدفوع موجب انتشار بیشتر آلودگی می شود.



کیست هیداتیک چه علائمی دارد؟

پس از بلع تخم، هر اندامی از بدن می تواند محل بوجود آمدن کیست باشد و بسته به اینکه در کبد یا ریه کیست ایجاد شده باشد، اختلال در عملکرد همان عضو را خواهیم داشت.

علائم این بیماری در ریه از درد ساده در قسمت راست شکم تا تنگی نفس، سرفه های خشک، عفونت های ثانویه به دنبال پاره شدن کیست در اعضای داخلی و شوک متغیر است.

از علائم دیگر می توان احساس درد هنگام نفس

