




مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

بیماری نقص دیواره بین دو دهلیز (ASD) کودکان چیست؟

نقص دیواره بین دهلیزی



ویژه: والدین بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۱/۱۵

کد پمفلت: PA-۲۱-۱۰۰۱

شماره بازنگری: ۰۵

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: دپارتمان جراحی قلب- واحد آموزش سلامت

* از دریافت میزان کالری مناسب در هر روز اطمینان حاصل کنید و با تغذیه خوب روند بهبودی را افزایش دهید.

پس از بسته شدن حفره دیواره سپتوم ASD و گذشت زمانی قابل توجه برای بهبود، بیشتر کودکان دیگر علائم و مشکلات بیشتری را تجربه نخواهند کرد.

در صورتی وجود چه علائمی در کودک باید به پزشک مراجعه کنید؟

وجود مشکلات تنفسی که فوراً باید به اورژانس مراجعه کنید.

* رنگ مایل به آبی در اطراف دهان، لب ها یا زبان

* اشتهاى کم یا مشکل در غذا دادن به کودک

* وزن گیری نامناسب کودک

* کاهش فعالیت کودک

* تب طولانی یا بی دلیل

* افزایش درد، حساسیت یا ترشحات ناشی از برش جراحی

منابع:

- کتاب قلب و عروق هاریسون ۲۰۲۲ ترجمه دکتر قارونی و همکاران

- کتاب بیماری های مادرزادی قلب تألیف دکتر مجید ملکی و همکاران سال ۱۳۹۹

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

* در روز های اولیه در منزل، فرزند شما باید در تخت خود استراحت کند و فعالیت های آرامی همچون مطالعه، خوابیدن و تماشا کردن تلویزیون را داشته باشد. پزشک معالج به شما خواهد گفت که فرزندان چه زمانی می تواند دوباره به مدرسه برگردد.

* حدوداً ۶ هفته طول می کشد تا برش ایجاد شده جراحی بر روی قفسه سینه بهبود یابد. پس از آن، اگر مشکلی وجود نداشته باشد و پزشک معالج نیز تایید کند، کودک شما می تواند کاملاً بهبود یابد و به فعالیت های نرمال و عادی خود برگردد.

* برای ۶ ماه پس از کاتتریزاسیون یا بستن حفره ASD به کمک جراحی، برای انجام کارهای درمانی دهان و دندان و یا انجام جراحی حتماً با پزشک معالج فرزندان مشورت نمایید تا از بروز عفونت در ناحیه داخلی قلب جلوگیری به عمل آید.

پس از بهبود بافت قلب در گذر زمان، بیشتر بیماران دیگر نیازی به نگرانی در زمینه عفونت ندارند.


* پیگیر آزمایشات معمول و ماهانه فرزندان باشید.

* ارتباط خود را با پزشک متخصص قلب کودکان بطور منظم ادامه دهید.

* داروهای تجویز شده به طور منظم و صحیح استفاده شود.

* مراقبت از محل جراحی و پانسمان طبق دستور پزشک صورت پذیرد.

والدین گرامی:



با آرزوی سلامتی برای شما و فرزند دلبندتان

این مطالب به منظور آشنایی با بیماری نقص دیواره بین دو دهلیز و مراقبت های لازم در مورد آن تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

سوراخ بین دهلیز ها یا (ASD) چیست؟

بیماری (ASD) دوره رشد قلب جنین رخ می دهد و در زمان تولد کودک حضور دارد.

در اولین هفته های پس از شکل گیری جنین، قلب در حال شکل گرفتن خواهد بود. اگر مشکلی در حین این پروسه رخ دهد، ممکن است نتیجه آن ایجاد یک سوراخ در دیواره سپتوم دهلیزی باشد.

یکی از بیماری های مادرزادی قلب وجود نقص یا سوراخ بین دهلیزها می باشد.

این بیماری گاهی بدون علامت بوده و علامت تشخیصی آن خستگی در هنگام فعالیت و تپش قلب می باشد.



علائم این بیماری چیست؟

* گریه کردن و بی قراری کودک

* تپش قلب کودک

* کمبود اشتها

* رشد ضعیف

* خستگی

* تنگی نفس

* سختی در تنفس

* عفونت های مکرر تنفسی در کودکان

* داشتن تنگی نفس در حین فعالیت های بدنی


بیماری (ASD) چگونه تشخیص داده می شود؟

اگر پزشک صدای خاص و غیر نرمال قلب کودک شما را بشنود و در وجود یک نقص به شک بیوفتد، کودک را به یک متخصص قلب کودکان ارجاع خواهد داد. پزشکی که تخصص وی تشخیص و درمان مشکلات قلبی کودکان است.

اگر وجود مشکل (ASD) یک گزینه تشخیصی باشد، این پزشک متخصص ممکن است یک یا چند آزمایش زیر را درخواست کند:

* **آزمایش اشعه ایکس قفسه سینه:** که در آن تصویری از قلب و ارگان های کناری آن تولید می شود.

* **الکتروکاردیوگرام (EKG):** که در آن فعالیت الکتریکی قلب ضبط می شود و می تواند میزان گردش خون در سمت راست قلب را مشخص کند.



* **اکوکاردیوگرام (اکو قلب):** که در آن از امواج صوتی جهت تولید تصویری از قلب و مشخص کردن گردش خون در قلب استفاده می شود. این روش تشخیصی درد و ناراحتی برای کودک ایجاد نخواهد کرد.

ممکن است پزشک در حین استفاده از گوشی طبی خود بتواند صداهای غیر نرمال قلب را تشخیص دهد.

بیماری (ASD) چند نوع دارد؟

با توجه به اینکه این نقص در کجای دیواره دهلیز باشد انواعی دارد که بر همین اساس نامگذاری می شود.

درمان این بیماری چگونه انجام می شود؟

با استفاده از روش جراحی قفسه سینه باز می شود، سپس کودک بر روی پمپ قلب و ریه مصنوعی قرار می گیرد و در نهایت سوراخ بین دهلیزی توسط زدن بخیه (اگر سوراخ کوچک باشد) بسته می شود.

خود مراقبتی بیماری (ASD) شامل چه مواردی است؟

در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد کودکان می توانند معمولاً سه تا چهار روز بعد از عمل جراحی بیمارستان را ترک کنند.

