



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

بیماری دریچه ای قلبی چیست؟



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۱/۱۵

کد پمفلت: PA-۲۱-۱۰۰۷

شماره بازنگری: ۰۵

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: دپارتمان جراحی قلب- واحد آموزش سلامت

* توصیه زیر را جدی بگیرید:

در صورتی که بعد از عمل جراحی دریچه قلب نیاز به انجام جراحی و یا دندانپزشکی داشتید برای جلوگیری از عفونت دریچه باید حتما زیر نظر پزشک جراح قلب یا دندانپزشک خود تحت درمان آنتی بیوتیک قبل و بعد از اعمال جراحی و دندانپزشکی قرار بگیرید

در صورت بروز چه علائمی باید به پزشک مراجعه کنید؟

- * کم شدن صدای دریچه مصنوعی قلب
- * وجود کبودی در قسمت های مختلف بدن
- * تنگی نفس و یا هر گونه تغییر در وضعیت بیمار
- * خونریزی از نقاط مختلف بدن مانند خون دماغ، خونریزی لثه، ادرار خونی و ...

منابع:

- کتاب قلب و عروق هاریسون ۲۰۲۲ ترجمه دکتر قارونی و همکاران
- کتاب قلب و عروق سیسیل ۲۰۲۲ ترجمه دکتر قارونی- دکتر قوام
- در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

وارفارین شیشه عمر شما محسوب می شود.

مقدار مصرف داروی وارفارین بر اساس آزمایش PT تعیین می شود.

این آزمایش زیر نظر پزشک معالج شما در هفته اول و تا یک ماه بعد از عمل به مدت کوتاهی از هم انجام خواهد شد. بعد از تنظیم وارفارین مصرفی، انجام آزمایش PT با فاصله بیشتر و بر اساس تشخیص و نظر پزشک معالج شما انجام خواهد شد.

برای شناخت بیشتر قرص وارفارین و نیز آشنایی با علائم و عوارض ناشی از قطع قرص و یا استفاده بیش از حد حتما برگه آموزش وارفارین و دفترچه ای تحت عنوان دفترچه PT (جهت ثبت آزمایشات دوره ای PT و INR و تنظیم مقدار مصرف قرص وارفارین) بطور جداگانه در اختیار شما قرار میگیرد، لطفا آن را مطالعه کنید.

از مهمترین و جدی ترین توجهات لازم پس از عمل جراحی دریچه قلب **جلوگیری از خطر عفونت دریچه** است.

بنابراین مراقبت شدید جهت پیشگیری از عفونت حتما باید صورت گیرد لذا در صورت بروز علائمی مانند تب، لرز، بی اشتهایی، درد های پراکنده عمومی در سراسر بدن و خستگی طولانی مدت (بیش از ۱ تا ۳ روز) حتما به پزشک معالج خود مراجعه کنید.

در صورت مراجعه به هر پزشک (غیر از پزشک معالج خود) حتما وی را در مورد دریچه مصنوعی قلب و مصرف قرص ضد انعقاد خون (وارفارین) با خبر سازید.



مردجوی گرامی:

با آرزوی سلامتی برای شما

این مطالب به منظور آشنایی با بیماری دریچه‌ای قلبی و مراقبت‌های لازم بعد از عمل تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

بیماری دریچه‌ای قلب چیست؟

بیماری دریچه‌ای قلب عبارتند از: عارضه بیماری‌هایی که یک یا چند تا از ۴ دریچه قلب را مبتلا می‌کند. این بیماری‌ها به دو صورت مادرزادی و اکتسابی هستند.

علل بیماری دریچه‌ای قلب شامل چه مواردی است؟

* تب روماتیسمی

* نارسایی قلب

* عفونت لایه داخلی قلب

* تصلب شرایین (تجمع چربی داخل شریان‌های خون)

* بالا بودن فشار خون

* تزریق وریدی مواد مخدر

* نورو سفلیس (عفونت دستگاه عصبی)



علائم شایع بیماری‌های دریچه‌ای قلب چیست؟

* خستگی و ضعف

* احساس خفگی یا غش کردن

* درد قفسه سینه

* تنگی نفس که باعث بیدار شدن فرد از خواب می‌شود.

* در اکثر مواقع ابتدا بیمار در موقع فعالیت دچار علامت می‌شود اما به مرور علایم بیشتر و شدیدتر می‌شود.

عوامل افزایش دهنده بروز خطر در این بیماری کدام است؟

* سن بالای ۶۰ سال

* سابقه خانوادگی بیماری قلبی

* حاملگی

* خستگی

* کار زیاد

بیماری دریچه‌ای قلب چگونه تشخیص داده می‌شود؟

* آزمایش خون

* نوار قلب و اکو قلبی

* عکس از قلب و ریه

* آنژیوگرافی



چگونه می‌توانیم از بیماری دریچه‌ای قلب پیشگیری کنیم؟

* در صورت بروز گلو درد و تب سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

* در صورت وجود بیماری‌هایی که باعث آسیب دریچه قلبی می‌شود به پزشک مراجعه کنید.

* در موارد سابقه فامیلی مثبت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج انجام شود.

بیماری دریچه‌ای قلب چگونه درمان می‌شود؟

در اغلب موارد درمان طبی و با کمک دارو می‌باشد.

درمان جراحی: تعویض دریچه به دو صورت انجام می‌گیرد.
* دریچه فلزی بیشتر در جوان‌ها (به علت طول عمر بیشتر)

* دریچه غیر فلزی (بافتی): در افراد مسن‌تر، خانم‌ها در سن بارداری، مواردی که استفاده طولانی مدت از داروهای ضد انعقاد امکان‌پذیر نیست.

آنچه لازم است بدانید:

دریچه مصنوعی قلب خصوصاً دریچه مکانیکال (فلزی) جسم خارجی در بدن تلقی شده و احتمال **لخته شدن خون** بر روی این دریچه وجود دارد.

بنابراین بسیار مهم است که برای پیشگیری از لخته خون بعد از این عمل جراحی از قرص ضد انعقاد خون (وارفارین) در تمام مدت عمر استفاده کنید.

