




مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

دایسکشن آئورت (پارگی رگ های قلب)



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۱/۱۵

کد پمفلت: PA-۲۱-۱۰۱۸

شماره بازنگری: ۰۱

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: دپارتمان جراحی قلب- واحد آموزش سلامت

پس از ترخیص در صورت بروز چه علائمی باید به پزشک مراجعه کنید؟

- ◇ کاهش حجم ادرار علیرغم دریافت مایعات
- ◇ ترشح چرکی و یا بدبو از محل زخم
- ◇ تب بیشتر از ۳۸/۵ درجه سانتیگراد
- ◇ افزایش یا تند شدن ضربان قلب
- ◇ ضعف و بی حالی شدید
- ◇ ورم اندام ها



منابع :

- کتاب قلب و عروق هاریسون ۲۰۲۲ ترجمه دکتر قارونی و همکاران
- کتاب قلب و عروق سیسیل ۲۰۲۲ ترجمه دکتر قارونی- دکتر قوام
- کتاب برونر و سودارث قلب و عروق ۲۰۲۲ ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم و همکاران

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت **رایگان** همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس : مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

توصیه های خودمراقبتی بعد از عمل جراحی:

- توصیه می شود از بلند کردن و یا هل دادن اجسام سنگین جدا بپرهیزید.
- فعالیت خود را با احتیاط و زیر نظر پزشک معالج شروع کنید.
- توصیه می شود مواد مغذی کم نمک، کم چربی و پرپروتئین استفاده کنید.
- از ناحیه قفسه سینه و پانسمان محل جراحی خود مراقبت کنید.
- داروهای خود را به طور منظم مصرف کنید.
- پیگیر ویزیت های منظم خود با پزشک معالجتان باشید.
- از استعمال دخانیات جدا بپرهیزید و در صورت مصرف دخانیات حتما نسبت به ترک آن اقدام کنید.

چگونه می شود از بروز این بیماری پیشگیری نمود؟

⇐ پرهیز از مصرف دخانیات

⇐ حفظ وزن ایده ال

⇐ کنترل فشار خون



مداخله جراحی گرامی:

این مطالب به منظور آشنایی با دایسکشن آئورت (پارگی رگ های قلب) و مراقبت های لازم بعد از آن تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

دایسکشن آئورت (پارگی رگ های قلب)

چگونه اتفاق می افتد؟

شرایطی جدی است که در آن لایه داخلی آئورت که بزرگترین شریان بدن است پاره می شود. ورود خون به لایه میانی و خارجی رگ باعث بوجود آمدن شکاف می شود و درد زیادی ایجاد می کند. در صورتی که لایه خارجی پاره شود، خونریزی وسیع رخ داده و می تواند مرگبار باشد.

پارگی آئورت چه علائمی دارد؟

- درد ناگهانی و شدید شکم و یا زیر جناغ که حالت خنجری دارد.

- کوتاهی تنفس

- تهوع و استفراغ

- نبض ضعیف در یک دست یا پا نسبت به اندام مقابل

- درد پا (سختی در راه رفتن - فلج پا)

- اختلال هوشیاری



عوامل خطر دایسکشن آئورت (پارگی

رگ های قلب):

* تنگی آئورت در زمان تولد (کوآرکتاسیون آئورت)

* شریان ضعیف شده و برآمده (آنوریسم)

* فشار خون بالا و کنترل نشده

* نقص در دیواره آئورت

* تصلب شرائین

* برخی از بیماری های ژنتیکی

این بیماری در مردان شایع تر و معمولاً در سنین ۶۰ تا ۸۰ سال بیشتر است.

دایسکشن آئورت (پارگی رگ های قلب)

ممکن است چه عوارضی به همراه داشته باشد؟

- آسیب دریچه آئورت یا پارگی قلب

- آسیب به کلیه ها یا روده ها

- سکته قلبی

این بیماری چگونه تشخیص داده می شود؟

- گرافی قفسه سینه

- اکوکاردیوگرافی

- سی تی (CT) آنژیوگرافی

- آنژیوگرافی



گزینه های درمانی برای دایسکشن آئورت

عبارتند از:

- عمل جراحی قلب باز

- جراحی عروق که استنت (فنر) از طریق کاتتر وارد رگ های خونی می شود.

- دارو درمانی

با توجه به سنگین بودن عمل جراحی احتمال خطر در حین یا بعد از عمل وجود دارد ولی پزشک شما نهایت دقت و توجه را در راستای کاهش عوارض خواهد داشت.

