

* در طول شیمی درمانی هضم مواد غذایی به تاخیر می افتد و اندکی مشکل می شود. استفاده از غذاهای نفاخ و پرچرب فرد را دچار سوء هاضمه می کند. به علاوه بدن به پروتئین و انرژی بیشتری احتیاج دارد. بنابراین مصرف غذاهای گوشتی، تخم مرغ، شیر کامل، عسل، بستنی، شیرینی جات (البته خیلی شیرین نباشد) توصیه می شود.

* مصرف سبزیجات و میوه جات به علت داشتن ویتامین ها، مواد معدنی و اکسیدان ها برای مبتلایان به سرطان بسیار مفید است.

* جهت پیشگیری از نفخ، بهتر است در طول شیمی درمانی مصرف غذاهای پرفیبر خام نظیر: سبزیجات و میوه جات خام و دانه های خوراکی را محدود کنید.

* در فواصل نوبت های شیمی درمانی از میوه جات و سبزیجات بیشتر استفاده کنید و قبل از مصرف این مواد غذایی را به خوبی بشوئید و پوست آنها را بگیرید.

* در طول شیمی درمانی از خوردن غذاهای پرچرب پرهیز کنید. از نان کامل و اسنک های دارای گندم کامل استفاده کنید.

* گوشت و تخم مرغ را به خوبی بپزید. استفاده از تخم مرغ خام توصیه نمی شود.



* آبمیوه ها، محصولات لبنی و عسل مورد استفاده تان حتما پاستوریزه باشد و مواد غذایی که تاریخ مصرفشان گذشته است را اکیدا استفاده نکنید.

* از غذاهای بوفه ها و رستوران های سلف سرویس استفاده نکنید.



منابع:

<https://www.clinicalkey.com>

<https://medlineplus.gov>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت **رایگان** همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس : مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

تغذیه در دوران شیمی درمانی



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۴۰-۱۰۰۱

شماره بازنگری: ۰۲

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش شیمی درمانی - واحد آموزش سلامت

مُدِجَوِی گرامی:

این مطالب به منظور آشنایی با تغذیه در دوران شیمی درمانی تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

تغذیه و رژیم غذایی مناسب می تواند به کاهش عوارض شیمی درمانی کمک کند.

توصیه های تغذیه ای جهت مقابله با بی اشتهایی:

* برخی از افراد در وعده صبحانه اشتهای بهتری دارند، استفاده از حجم غذای بیشتر در این زمان توصیه می شود.

* اگر تمایل زیادی به خوردن ندارید، غذاهای اصلی را در ابتدای روز میل کنید و در طول روز از غذاهای مایع استفاده کنید.

* روزهایی که احساس می کنید میل به خوردن ندارید، سعی کنید روزانه حداقل ۶ الی ۸ لیوان مایعات بنوشید. آب برای انجام واکنش های بدن ضروری است.

* شکل طبخ غذا را اشتهای آور و به گونه ایی که شما را به غذا خوردن تحریک کند، تغییر دهید.

* زمانی که حالتان بهتر است از فرصت استفاده کنید و غذای بیشتری بخورید.

* ورزش منظم به افزایش اشتهای شما کمک می کند.

* غذاهای آماده را در دسترس داشته باشید تا هر موقع میل داشتید مصرف کنید.



* اگر میل به خوردن غذاهای جامد ندارید، از مایعات مانند سوپ، آب میوه و مواد مشابه استفاده کنید. توجه داشته باشید که این مواد باید حاوی مواد مغذی ضروری و پر کالری باشد.

* حین صرف غذا مایعات کمتری بنوشید، زیرا نوشیدنی ها ایجاد سیری کاذب می کنند.

* سعی کنید نوشیدنی خود را حداقل به فاصله ۳۰ الی ۶۰ دقیقه قبل یا بعد از غذا میل کنید.

روش های پیشگیری از درد کلو یا دهان:

در اثر رادیوتراپی و شیمی درمانی در دهان افراد حساسیت و دردناکی لثه ها و سوزش گلو یا مری بوجود می آید. برخی از غذاها دهان را تحریک کرده و بلع و جویدن را مشکل می کنند. افرادی که مبتلا به حساسیت مزمن دهان هستند بیشتر در معرض این مشکل قرار می گیرند.

* سعی کنید حتما قبل از شروع درمان با دندانپزشک مشورت نمائید.

* غذاهای نرم را که آسان جویده شده و بلع آنها راحت است میل کنید.

* از نی برای نوشیدن مایعات استفاده کنید.

* غذا را به قطعات کوچک تقسیم کنید.

* بهتر است دمای غذا در درجه حرارت اتاق یا خنک تر باشد. غذاهای داغ گلو یا دهان را تحریک می کند.

* غذا را با کره مارگارین یا آب گوشت رقیق مخلوط کنید تا بلعشان راحت تر شود.



* دهان خود را هر از چندگاهی با آب بشوئید تا باقیمانده غذا و باکتری ها از دهان پاک شود و ترمیم دهان سریعتر صورت گیرد.

روش های پیشگیری از تهوع و استفراغ:

* حجم غذای خود را در هر وعده کاهش دهید و همراه با غذا مایعات مصرف نکنید.

* در روزی که نوبت شیمی درمانی دارید، از خوردن غذاهای سنگینی که به آسانی قابل هضم نیستند بپرهیزید.

* تمریناتی که استرس و فشارهای روحی را کاهش می دهد مانند روش های تمرکز ذهن و تنفس عمیق انجام دهید.

* از پزشک خود برای کنترل تهوع و استفراغ، داروهای ضد تهوع درخواست کنید.

روش های پیشگیری از خستگی و افسردگی:

درمان سرطان ممکن است هفته ها یا ماه ها طول بکشد. این درمان حتی ممکن است سبب ایجاد بیماری یا ناراحتی هایی علاوه بر بیماری اصلی شود. بنابراین، برای استراحت خود در طول روز برنامه ریزی کنید.

- فعالیت های معمول خود را تا حد امکان سبک تر و کوتاه تر کنید و بیش از توان خود کار طولانی مدت انجام ندهید.

- پیاده روی های کوتاه مدت و تمرینات ورزشی منظم داشته باشید و زمان های کوتاهی را برای استراحت در طول روز در نظر بگیرید.

