



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

ختم حاملگی به روش طبی



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۱۸-۱۰۰۲

شماره بازنگری: ۰۵

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش جراحی زنان- واحد آموزش سلامت

* جهت پیگیری آزمایش با شماره ۰۵۱۳۸۰۲۲۶۳۸ از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ تماس بگیرید و در صورت آماده بودن جهت تحویل جواب آزمایش به بخش مراجعه نمایید



منابع:

کتاب بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۲۲

<https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

در برخی بیماران به جهت اطمینان از دفع کامل محصولات حاملگی سونوگرافی انجام می شود و در صورت دفع ناقص و خونریزی زیاد کورتاژ لازم و ضروری می باشد.

توصیه های پس از ترخیص:

* بعد از ترخیص داروی تجویز شده را به موقع استفاده نمایید.

* دوش گرفتن در منزل بلامانع می باشد.

* در صورت تب- لرز- ترشحات بدبو- خونریزی- درد قفسه سینه و درد در اندام ها باید سریعاً به اورژانس زنان مراجعه نمایید.

* بعد از سقط تا ۲ هفته از رابطه جنسی پرهیز نمایید و بعد از شروع رابطه جنسی حتماً از روش های جلوگیری از بارداری استفاده شود، چون امکان حاملگی مجدد از دو هفته بعد از سقط وجود دارد.

* ترجیحاً از قرص آهن و غذاهایی که آهن بیشتری دارند مانند گوشت، تخم مرغ، حبوبات، کشمش، خرما، اسفناج و ... استفاده شود.

* جواب آزمایش آسیب شناسی را بیست روز بعد از ترخیص پیگیری نموده و نزد پزشک مراجعه کنید.





مددجوی گرامی:

با آرزوی سلامتی برای شما

این مطالب به منظور آشنایی با روش ختم بارداری با دارو و مراقبت های لازم در مورد آن تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

ختم حاملگی به روش طبی:

سقط جنین به از دست دادن جنین تا قبل از هفته ۲۰ حاملگی اطلاق می شود و دلایل و انواع مختلفی دارد . در مواردی مانند سقط قانونی و یا سقط به دلیل مرگ جنین یا باقی ماندن جفت بعد از سقط خودبخودی میتوان از روش کورتاژ استفاده کرد.

ولی به دلیل اینکه تجویز قرص میزوپروستول عوارض و هزینه کمتری دارد و نیاز به بیهوشی ندارد مناسب تر است.



قرص میزوپروستول دارویی است که مورد تایید وزارت بهداشت بوده و در دو نوع ۲۰۰ و ۱۰۰ میلی گرمی موجود می باشد که طبق دستور پزشک با توجه به شرایط بیمار به صورت واژینال یا زیر زبانی تجویز می شود .

این دارو حتما باید زیر نظر پزشک مصرف شود و دوز دارو نیز متناسب با شرایط بیمار تعیین می شود.

درحال حاضر شرایط استفاده از این قرص در بیرون از بیمارستان وجود ندارد و بیمار باید بستری شود .

معمولا زمان تاثیر قرص حدود ۴ ساعت بعد از استفاده است که بصورت درد شکمی و انقباضات رحمی و خونریزی شروع می شود .

در صورت گذاشتن قرص در واژن از بلند شدن و راه رفتن بلافاصله پرهیز کنید .

عوارض قرص میزوپروستول:

اغلب افرادی که این دارو را استفاده کرده اند عوارض خاصی را گزارش نداده اند اما عوارضی که گاهی اتفاق می افتد شامل موارد زیر است:

- * اسهال و استفراغ
- * سرگیجه شدید
- * تب (شایعترین عارضه)



* مسمومیت

* خونریزی شدید

* تنگی نفس

* ضربان قلب کند و نا منظم

* کهیر- خارش و ورم به خصوص روی زبان- صورت و گلو

هشدار:

این قرص را به افراد دیگر توصیه نکنید، به خاطر اینکه بعضی از بارداری ها خارج از رحمی می باشند.

وقتی حاملگی بعد از سزارین قبلی و یا جراحی رحم اتفاق افتاده است ، **استفاده نابجا از این قرص می تواند باعث پارگی، خونریزی رحم و خونریزی داخل شکم شود و در نتیجه خطرات جانی برای بیمار داشته باشد .**

توجه : در صورت دفع هر گونه بافت لطفا اطلاع دهید تا نمونه جهت آزمایش آسیب شناسی فرستاده شود.

در صورتی که گروه خونی منفی دارید لطفا گروه خون همسر خود را اطلاع دهید تا در صورت نیاز آمپول رگام تزریق شود.

