



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

آشنایی با واکسیناسیون بدو تولد نوزاد



ویژه: عموم افراد جامعه

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۱۲/۱۵

کد پمفلت: PA-۰۰۰-۱۰۳۷

شماره بازنگری: ۰۰

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: واحد کنترل عفونت - واحد آموزش سلامت

کارت واکسن:

* حفظ این کارت جهت انجام بقیه مراقبت های بهداشتی الزامی می باشد.

* این کارت المثنی ندارد، لطفا در حفظ و نگهداری این کارت کوشا باشید و مراقب باشید کارت مفقود یا مخدوش نشود.

* ثبت نام مدرسه کودکان در آینده و یا خروج از کشور مستلزم داشتن این کارت است.

* در صورت دریافت کارت موقت، جهت گرفتن کارت اصلی و دائمی از طریق مرکز بهداشت دارای پرونده سلامت یا تماس با شماره ۰۵۱۳۸۰۲۲۸۵۱ اقدام فرمایید.

منابع:

- برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی ۱۴۰۳

- سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

www.behdasht.gov.ir

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت **رایگان** همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir



سن کودک/نوجوان	نام واکسن ها	بیماری های هدف	نحوه تجویز	مقدار تجویز
بدون تولد	ب. ث. ژ	سل	داخل جلدی	۰.۵ میلی لیتر
	فلج اطفال خوراکی	فلج اطفال	خوراکی	۴ قطره
	هپاتیت ب	هپاتیت ب	عضلانی	۱۰ سال و کمتر، نیم میلی لیتر بالای ۱۰ سال ۱ میلی لیتر
۲ ماهگی	فلج اطفال خوراکی	فلج اطفال	خوراکی	۴ قطره
	پنتاوالان	دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت ب، هموفیلوس آنفولانزا نوع ب	عضلانی	نیم میلی لیتر
	روتا ویروس	اسهال حاد	خوراکی	۴ میلی لیتر
	پنوموکوک	عفونت های پنوموکوک	عضلانی یا زیرجلدی	نیم میلی لیتر
۴ ماهگی	فلج اطفال خوراکی	فلج اطفال	خوراکی	۴ قطره
	پنتاوالان	دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت ب، هموفیلوس آنفولانزا نوع ب	عضلانی	نیم میلی لیتر
	فلج اطفال تزریقی	فلج اطفال	زیرجلدی یا عضلانی (ترجیحا عضلانی)	نیم میلی لیتر
	روتا ویروس	اسهال حاد	خوراکی	۴ میلی لیتر
	پنوموکوک	عفونت های پنوموکوک	عضلانی یا زیرجلدی	نیم میلی لیتر
۶ ماهگی	فلج اطفال خوراکی	فلج اطفال	خوراکی	۴ قطره
	پنتاوالان	دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت ب، هموفیلوس آنفولانزا نوع ب	عضلانی	نیم میلی لیتر
	فلج اطفال تزریقی	فلج اطفال	زیرجلدی یا عضلانی (ترجیحا عضلانی)	نیم میلی لیتر
	روتا ویروس	اسهال حاد	خوراکی	۴ میلی لیتر
	سرکخ (نوبت صفر، در استان های منتخب)	سرکخ	زیر جلدی	نیم میلی لیتر
۱۲ ماهگی	پنوموکوک	عفونت های پنوموکوک	عضلانی یا زیرجلدی	نیم میلی لیتر
	ام. ام. آر. (MMR)	سرکخ، سرخچه، اوریون	زیر جلدی	نیم میلی لیتر
۱۸ ماهگی	فلج اطفال خوراکی	فلج اطفال	خوراکی	۴ قطره
	تلات	دیفتری، کزاز، سیاه سرفه	عضلانی	نیم میلی لیتر
	ام. ام. آر. (MMR)	سرکخ، سرخچه، اوریون	زیر جلدی	نیم میلی لیتر
۶ سالگی	فلج اطفال خوراکی	فلج اطفال	خوراکی	۴ قطره
	تلات	دیفتری، کزاز، سیاه سرفه	عضلانی	نیم میلی لیتر



ام. ام. آر. (MMR): سرکخ - سرخچه - اوریون
مدیر: برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی ۱۴۰۳



هموطن گرامی:

این مطالب به منظور آشنایی با واکسیناسیون های بدو تولد تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید نوزاد سالم و ایمنی داشته باشید.

* انواع واکسن های بدو تولد:

واکسن ب.ث.ژ:

این واکسن به بازوی نوزاد تزریق می شود. معمولا محل تزریق طی یک ماه آینده زخم می شود و ممکن است زیر بغل نوزاد دانه بزند یا دچار تورم شود که به صورت خود به خودی ترمیم می یابد.

توصیه می شود در طی این مدت بهداشت محل زخم رعایت شود و از آسیب، خراش و خاراندن زخم پرهیزید.

محل زخم را با چسب یا پارچه نپوشانید و از مالیدن هرگونه کرم، پماد، الکل و هرگونه ماده شیمیایی یا گیاهی به زخم اجتناب کنید. این واکسن نیاز به کمپرس سرد و گرم ندارد.



واکسن هپاتیت:

این واکسن به پای نوزاد تزریق می شود. نوزاد طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از ترریق بی قراری دارد و ممکن است دمای بدن نوزاد کمی افزایش یابد که نیاز به دارو و گذاشتن کمپرس سرد و گرم ندارد.

توصیه می شود در این مدت شیرده کامل نوزاد ادامه داشته باشد.



قطره فلج اطفال:

در زمان ترخیص از بیمارستان با ارائه کارت واکسن پرستار یا ماما قطره را به نوزاد خواهند داد.

بعد از دریافت قطره تا ۲۰ دقیقه به نوزاد شیر ندهید و در صورت استفراغ شیر، در طی این دقایق مجددا جهت دریافت قطره اقدام نمایید.

