



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)



ویژه: عموم افراد جامعه

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۰۰-۱۰۰۳

شماره بازنگری: ۰۵

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: واحد کنترل عفونت - واحد آموزش سلامت

* در صورتی که بعد از مسافرت به مناطق روستایی و مجاورت با دام و کنه به طور ناگهانی دچار تب، سردرد، درد عضلات و خونریزی از معده و بینی شدید سریعاً به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنید.



درمان:

* اساس درمان مراقبت از بیمار، اصلاح آب و الکترولیت و در صورت لزوم جایگزینی خون و پلاکت می باشد.

* از داروی ریبوورین برای درمان موارد قطعی بیماری طبق دستور پزشک استفاده می شود.

منابع:

<https://www.clinicalkey.com>

<https://medlineplus.gov>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت **رایگان** همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

روش های پیشگیری از ابتلا به بیماری:

- * حذف ناقل بیماری شامل حمام دام و سم پاشی به موقع دام ها و جایگاه آنها به منظور مبارزه با کنه های ناقل
- * استفاده از پوشش مناسب در هنگام کار با دام ها برای جلوگیری از دسترسی کنه ها به گزش
- * پوشیدن لباس کار یکسره کامل و استفاده از کلاه، ماسک، دستکش، چکمه، عینک محافظ در هنگام کشتار دام به منظور ممانعت از برخورد با ترشحات آلوده
- * خودداری از خرید و مصرف گوشت دامی که از راه های غیرقانونی و قاچاق وارد کشور می شوند.
- * اجتناب از کشتار دام در منازل، معابر عمومی و مراسم (عروسی، عزا، ورود حجاج، زائرین عتبات عالیات)
- * استفاده از وسایل حفاظت فردی در هنگام تماس با لاشه، امعا و احشا، خون و ترشحات دام
- * خودداری از مصرف گوشت و جگر خام و نیم پز
- * استفاده از دستکش برای شستن و خرد کردن گوشت تازه و جگر
- * اجتناب از گرفتن و له کردن کنه ناقل بیماری بر روی پوست



هموطن گرامی:

این مطالب به منظور آشنایی شما با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) تهیه شده است. امید است با مطالعه مطالب ارائه شده، در جهت پیشگیری و درمان این بیماری اطلاعات لازم را کسب نمایید.

تب کریمه کنگو (CCHF) چیست؟

بیماری ویروسی کریمه کنگو یک بیماری خونریزی دهنده تب دار حاد است که بوسیله کنه منتقل می شود و در آسیا اروپا و آفریقا وجود دارد.


با وجود اینکه بیماری مخصوص حیوانات است ولی موارد تک گیر و همه گیری های ناگهانی این بیماری در انسان ها نیز اتفاق می افتد.

در صورت عدم درمان به موقع، در ۳۰ تا ۵۰ درصد موارد مرگ اتفاق خواهد افتاد.

وقوع این بیماری در انسان و دام فصلی است و اغلب در فصول گرم سال، همزمان با افزایش فعالیت کنه های ناقل آن بروز می نماید.

راه های انتقال بیماری:

مهمترین راه انتقال بیماری از حیوان به انسان و یا از انسان به انسان و در کشور ما، تماس با ترشحات خونی دام آلوده یا انسان بیمار می باشد. در بدن انسان و دام حدود یک الی دو هفته، ویروس در خون وجود داشته و پس از این مدت دیگر ویروس از بین رفته و از بدن آنها دفع نمی گردد.



علائم و نشانه های بیماری:

در انسان بیماری به اشکال حاد، تحت حاد و خفیف بروز می کند.

در دوره نهفتگی (۳ تا ۹ روز) که از زمان برخورد با ترشحات دام یا انسان آلوده یا گزش کنه های آلوده، شروع می شود و بیمار علائمی ندارد.

در دوره پیش خونریزی (۳ تا ۱۶ روز) علائم تب و سردرد شدید یا علائمی شبیه بیماری آنفلوآنزا آغاز می شود.

در دوره خونریزی (۳ تا ۵ روز) بیمار با یک یا چند علامت مثل خونریزی در پوست، اسهال و استفراغ خونی، خونریزی از دهان، چشم، گوش، لثه ها و یا خلط خونی مشاهده می شود. مرگ در این مرحله در اثر از دست دادن خون و مایعات بدن و خونریزی در اعضای حساسی مثل مغز، قلب، کبد و کلیه حادث می شود. در صورت مقاومت بیمار در برابر بیماری و درمان به موقع، بیمار از مرگ نجات یافته و وارد دوره نقاهت و بهبودی می گردد.



علائم بیماری در دام:

در دامها، در اکثر موارد بیماری بدون علامت است. علائم بیماری در دام های حساسی مثل گاو، گوسفند و بز، در نهایت شدت خود به شکل تب و سقط جنین بروز می کند. به همین دلیل شناسایی دام مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از روی علائم بالینی غیر ممکن است.



افراد در معرض ابتلا:

افراد در معرض خطر ابتلا به این بیماری شامل کارگران کشتارگاه، کشتارکنندگان غیر مجاز دام، دامداران، زنان خانه دار روستایی که با ترشحات و یا گوشت گرم تازه دام آلوده کشتار شده در تماس هستند. همچنین رانندگان کامیون های حمل دام زنده، پرسنل دامپزشکی، اطرافیان بیمار، پزشکان و پرستاران در تماس با آن در معرض خطر قرار دارند.

