



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

قرص آپیکسابان



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۳۶-۱۰۱۰

شماره بازنگری: ۰۱

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: دپارتمان قلب- واحد آموزش سلامت

* اسیدهای چرب امگا ۳ ممکن است اثرات ضد انعقادی (رقیق کننده خون) آپیکسابان را افزایش دهد.

* محصولات گیاهی با اثرات ضد انعقادی به عنوان مثال یونجه، انیس، زغال اخته ممکن است اثرات آپیکسابان را افزایش دهد.

موارد منع مصرف دارو:

بارداری و شیردهی، نارسایی کبدی متوسط تا شدید، سن کمتر از ۱۸ سال، بیماران با دریچه مصنوعی قلب، نارسایی کلیه

شرایط نگهداری دارو:

این دارو باید در دمای اتاق زیر ۳۰ درجه و دور از دسترس اطفال و به دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

منابع:

<https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate>

<https://medlineplus.gov>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

موارد احتیاط و هشدار حین مصرف داروی آپیکسابان:

* بدون دستور پزشک مصرف آپیکسابان را قطع نکنید چون ممکن است بعد از قطع مصرف دارو هنوز هم در معرض خطر تشکیل لخته خون و سکتة باشید به همین دلیل پزشک ممکن است پس از قطع این دارو داروی ضد انعقاد (رقیق کننده خون) دیگری برای شما تجویز کند.

* اگر قادر به بلعیدن قرص ها نیستید می توانید آنها را خرد کرده با آب یا آب سیب مخلوط کنید البته باید بلافاصله بعد از آماده سازی این ترکیب آن را میل کنید.

* هرگز بیشتر یا کمتر از دوز تجویز شده مصرف نکنید. در صورتی که دارای مشکلات قلبی- عروقی، کبدی و کلیوی هستید و یا دریچه مصنوعی دارید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

* اگر قصد جراحی یا انجام اقدامات پزشکی یا دندانپزشکی دارید به پزشک یا دندان پزشک خود بگویید که داروی آپیکسابان مصرف می کنید.

* آب گریپ فروت ممکن است اثرات آپیکسابان را افزایش دهد و بیمارانی که آب گریپ فروت مصرف می کنند بیشتر در معرض خونریزی قرار می گیرند.



با آرزوى سلامتى براى شما

اين مطالب به منظور آشنائى با مصرف داروى آپيكسابان و مراقبت هاى لازم در مورد آن تهيه شده است. اميد است با مطالعه آن قادر باشيد دوره درمان خود را به خوبى مديريت نماييد.

قرص آپيكسابان چيست؟

يك داروى ضد انعقاد است كه با رقيق كردن خون باعث پيشگيرى از تشكيل لخته خون در بدن مى شود.

اين دارو براى پيشگيرى از ترومبوز وريد عمقى (لخته شدن خون در پاها) يا آمبولى ريه (لخته شدن خون در ريه ها) پس از جراحى تعويض مفصل ران، زانو و همچنين پيشگيرى و درمان بروز ترومبوز وريد عمقى يا آمبولى ريوى در افراد با سابقه ابتلا به آنها، استفاده مى شود.

همچنين براى بيماران مبتلا به فيبريلاسيون دهليزى (ضربان قلب نامنظم و سريع) براى کاهش خطر لخته خون و کاهش بروز سكته مغزى تجويز مى شود.

نحوه مصرف آپيكسابان:

اين قرص ها با دوز ۲,۵ و ۵ ميلى گرم روزى دو بار به صورت خوراكى و طبق دستور پزشك همراه با غذا يا بدون غذا مورد استفاده قرار مى گيرد.

دارو هر روز بايد در ساعت مشخصى مصرف شود.

چه مدت بايد آپيكسابان را مصرف كنيد؟

طول مدت درمان با آپيكسابان بسته به نظر پزشك معالج و با توجه به ارزيابى نوع بيمارى و شرايط جسمانى بيمار تعيين مى گردد.

در صورت فراموش كردن مصرف قرص آپيكسابان چه كنيد؟

اين قرص هر ۱۲ ساعت طبق دستور پزشك تجويز مى شود.

* اگر يك دوز از دارو را فراموش كرديد به محض به خاطر آوردن آن را مصرف كنيد، اما اگر نزديك زمان مصرف دوز بعدى بود از مصرف دوز فراموش شده صرف نظر كنيد.

* همچنين دوز بعدى را به موقع مصرف كنيد و براى جبران فراموشى دوز دارو را دو برابر نكنيد.

عوارض جانبى داروى آپيكسابان:

- سردرد

- خارش پوستى

- خونريزى كه ممكن است خفيف باشد مانند:

- خونريزى از بينى

- كبودى بى دليل

- خونريزى بيشتر قاعدگى

- خونريزى لثه هنگام مسواك زدن مى باشد.

- خونريزى شديد شامل خونريزى در ادرار

- خونريزى در مدفوع كه مدفوع قرمز يا سياه رنگ است

- سرفه همراه با دفع خون

- لخته هاى خون در استفراغ

در صورت بروز هرگونه علائم به صورت غيرطبيعى هنگام

مصرف آپيكسابان با پزشك خود مشورت نماييد.