



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

داروی کلوپیدوگرل (پلاویکس-زیلت-اسویکس)



ویژه: بیماران


تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۳۶-۱۰۰۲

شماره بازنگری: ۰۶

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: دپارتمان قلب- واحد آموزش سلامت

لازم به ذکر است قرص کلوپیدوگرل با نام های تجاری دیگر در بازار موجود است مثل (پلاویکس- زیلت و اسویکس) لطفا نوع دریافتی قرص را به اطلاع پزشک برسانید.



منابع:

<https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate>

<https://medlineplus.gov>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت **رایگان** همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

در چه صورتی باید به پزشک مراجعه کنید؟

از آنجا که کلوپیدوگرل (پلاویکس) مانع ایجاد لخته در خون می شود، می تواند باعث تشدید خونریزی حتی به علت یک آسیب جزئی گردد. بنابراین باید در صورت وجود خونریزی که به هر علتی متوقف نمی شود به پزشک خود مراجعه کنید.

هرگاه دچار خونریزی در یکی از اعضاء خود شدید حتما به پزشک مراجعه کنید.

علائم خونریزی بیشتر در معده و روده نمایان می شود. در صورت وجود علائمی مانند وجود خون در ادرار، مدفوع سیاه و خونی یا سرفه هایی همراه با دفع خون حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

در صورتی که قرار است شما تحت عمل جراحی قرار گیرید یا زمانی که به دندان پزشک مراجعه می کنید موضوع مصرف کلوپیدوگرل (پلاویکس) را به اطلاع پزشک برسانید.

تحت هیچ شرایطی بدون اطلاع و تجویز پزشک داروی کلوپیدوگرل (پلاویکس) را جهت انجام جراحی یا کشیدن دندان قطع نکنید.

هرگز در زمانی که تحت درمان با کلوپیدوگرل (پلاویکس) هستید بدون مشورت پزشک از داروهای مسکن از قبیل ایبوپروفن، دیکلوفناک و ناپروکسن استفاده نکنید.

مصرف استامینوفن بلامانع است.



با آرزوی سلامتی برای شما

این مطالب به منظور آشنایی با نحوه مصرف داروی کلوییدوگرل (پلاویکس) و مراقبت‌های لازم در مورد آن تهیه شده است. امید است با مطالعه مطالب قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

قرص کلوییدوگرل (پلاویکس) چیست؟

یک داروی ضد انعقاد (ضد لخته شدن خون) است که جهت پیشگیری از حملات قلبی، سکته مغزی و سایر مشکلات گردش خون در افراد مبتلا به آترواسکلروز (بیماری سخت شدن شریان‌ها) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این دارو از تشکیل لخته خون در عروق جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود خون به راحتی در عروق حرکت کند و اکسیژن را به مغز، قلب و سایر اعضا برساند.

در صورتی که پزشک شما، داروی کلوییدوگرل (پلاویکس) را به دلیل اینکه تحت آنژیوپلاستی عروق قلب همراه با کارگذاری استنت (فنر) قرار گرفته اید تجویز نموده است، مصرف این دارو جهت کاهش احتمال بروز مجدد حمله قلبی و کاهش احتمال گرفتگی استنت (فنر) تعبیه شده بسیار اهمیت دارد.



چه مدت باید کلوییدوگرل مصرف کنید؟

در افرادی که تحت آنژیوپلاستی عروق قلب (کارگذاری فنر) قرار گرفته اند، مدت زمان دارو بر اساس شرایط بیمار فرق می‌کند.

بیمارانی که در شرایط اورژانس و سکته حاد قلبی تحت عمل قرار گرفته اند باید حداقل به مدت یکسال و بیمارانی که در شرایط عادی تحت عمل قرار می‌گیرند حداقل به مدت شش ماه دارو را طبق نظر پزشک مصرف کنند.

طول مدت درمان بر اساس شرایط هر بیمار، تعداد فنر استفاده شده و محل کارگذاری استنت می‌تواند متفاوت باشد. این موضوع را پزشک معالج شما تعیین خواهد کرد.

در صورت فراموش کردن مصرف قرص کلوییدوگرل (پلاویکس):

* اگر مصرف یک دوز از قرص کلوییدوگرل (پلاویکس) را فراموش کردید تا ۱۲ ساعت بعد از زمان معمول آن می‌توانید دارو را مصرف نمایید.

* در صورتی که ۱۲ ساعت بیشتر گذشته باشد از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.



عوارض جانبی احتمالی:

- * حالت تهوع
- * درد و ناراحتی معده
- * سردرد ناگهانی و شدید
- * گیجی
- * درد قفسه سینه
- * کبودی زیر پوست
- * خارش بدن
- * خونریزی از بینی
- * پوست ریزی کف دست‌ها و پاها

