



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

تیکاگلولور (بریلینتا)



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۳۶-۱۰۱۱

شماره بازنگری: ۰۱

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت
تهیه کننده: دپارتمان قلب- واحد آموزش سلامت

موارد هشدار و احتیاطات:

≤ در مدت درمان با این دارو در زمان‌های مقرر به پزشک مراجعه نموده و تست‌های آزمایشگاهی (مانند شمارش کامل خون و آزمایش‌های کلیه مانند اسید اوریک) را طبق دستور به طور منظم انجام دهید.

≤ آب گریپ فروت ممکن است اثر داروی تیکاگلولور را افزایش دهد. محصولات گیاهی مانند: یونجه، بادیان، زغال اخته ممکن است اثرات نامطلوب و سمی دارو را افزایش دهد و باعث خونریزی شود.

≤ در مدت درمان با این دارو از مصرف الکل بپرهیزید.

≤ این دارو ممکن است باعث سرگیجه شود لذا قبل از انجام کارهایی مانند: رانندگی و کار با ماشین آلات از هوشیاری خود مطمئن شوید.

≤ برای کاهش احتمال بریدگی، کبودی یا جراحت هنگام به کار بردن اشیاء تیز مانند تیغ و ناخن گیر احتیاط کنید.

منابع:

<https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate>

<https://medlineplus.gov>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰
وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

عوارض داروی تیکاگلولور:

در صورت بروز عوارض زیر فوراً به پزشک اطلاع دهید. تنگی نفس و قطع تنفس در هنگام خواب شایع‌ترین عوارض تیکاگلولور است که در بیشتر موارد تنگی نفس در عرض یک هفته پس از درمان برطرف می‌شود.

تنگی نفس معمولاً در ۲۴ ساعت اول درمان ایجاد می‌شود و قطع تنفس در هنگام خواب هم ممکن است از ۷ روز تا یک سال پس از شروع درمان ایجاد شود.

- کبودی یا خونریزی آسان
- خونریزی شدید که نمی‌توانید آن را کنترل کنید مانند: خونریزی شدید بینی
- استفراغ همراه با خون یا شبیه به قهوه
- ادرار خونی (قرمز صورتی تا تیره)
- مدفوع خونی یا سیاه رنگ

در صورت بروز عوارض زیر فوراً به اورژانس مراجعه فرمایید:

غش، گیجی، مشکل در صحبت کردن، تغییرات بینایی، ضربان قلب آهسته، ضربان سریع یا نامنظم و علائمی مانند اشکال در انعقاد خون (مانند لکه‌های قرمز یا بنفش بر روی پوست)

شرایط نگهداری:

دارو را دور از دسترس کودکان و در جایی خشک و خنک نگه دارید.



ممدجوى گرامى:

با آرزوى سلامتى براى شما

اين مطالب به منظور آشنائى با قرص تيكاگرلور تهيه شده است. اميد است با مطالعه آن قادر باشيد دوره درمان خود را به خوبى مديريت نماييد.

قرص تيكاگرلور (بريلنتا) چيست؟

قرص تيكاگرلور در بيماراني كه مشكلات حاد عروق كرونرى (عروق قلبى) دارند، تجويز مى شود و از چسبندگى پلاكتى (لخته شدن خون) جلوگيرى مى كند.

اين دارو از لخته شدن خون پس از آنژيوپلاستى و گذاشتن استنت (فنر) جلوگيرى مى كند و باعث مى شود خون در بدن شما به صورت روان جريان يابد و باعث پيشگيرى از سكته مغزى و حمله هاى قلبى مى شود.



نحوه صحيح مصرف داروى تيكاگرلور:

* دوز و مقدار داروى تيكاگرلور از فردى به فرد ديگر متفاوت است، لذا دارو را دقيقاً همانطور كه پزشك برايتان تجويز كرده است، استفاده نموده و از كم و زياد كردن خودسرانه مقدار و مدت زمان مصرف آن اجتناب كنيد.

* اين دارو را به طور منظم و در ساعات مشخصى از روز مصرف نماييد.

* اين دارو را مى توانيد قبل يا بعد از غذا مصرف كنيد.

* مولتى ويتامين ها و امگا 3 اثرات داروى تيكاگرلور را زياد مى كند. لذا حتماً براى مصرف داروهاى تقويتى با پزشك خود مشورت كنيد.

* اين دارو معمولاً همراه با آسپرين و با نظارت پزشك معالج تجويز مى شود، لذا قبل از انجام هرگونه عمل جراحى در مورد مصرف داروى تيكاگرلور با پزشك معالج خود مشورت كنيد.

موارد منع مصرف:

- حساسيت به اين دارو يا ديگر داروها

- مشكلات ضربان قلب (ضربان قلب آهسته، سريع يا نامنظم)

- مشكلات تنفسى مانند آسم يا بيمارى انسدادى مزمن ريوى

- مشكلاتى كه احتمال خونريزى به دنبال مصرف اين دارو را افزايش مى دهد مانند: (هموفيلى، زخم معده و خونريزى هاى مكرر از بينى)

- مشكلات كبدي

- بيمارى نقرس

- سطح بالاى اسيد اوريك

- چنانچه اخيرا جراحى انجام داده ايد.

*در باردارى و شيردهى اين دارو تجويز نمى شود.

* در صورت داشتن هر کدام از اين مشكلات قبل از تجويز اين دارو پزشك را مطلع سازيد.

*يك هفته قبل از هرگونه عمل جراحى جهت ادامه يا قطع مصرف داروى تيكاگرلور با پزشك مشورت نماييد.

در صورت فراموش كردن مصرف قرص تيكاگرلور

چه اقدامى انجام دهيد؟

در صورت فراموش كردن يك نوبت داروى تيكاگرلور از مصرف نوبت فراموش شده اجتناب كنيد و طبق برنامه مشخص مصرف دارو را ادامه دهيد، هيچگاه مقدار دارو را دو برابر نكنيد.