



نحوه استفاده از جت اسپیسر:



تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ کد پمفلت: PA-06-1022 شماره بازنگری: ۰۰

	محفظه دارو را به دستگاه جت اسپیسر متصل کنید.
	یک بار اسپری را فشار دهید.
	یک بازدم عمیق انجام دهید (هنگام انجام بازدم، اسپری جلوی دهانتان نباشد).
	درپوش دهانی جت اسپیسر را بردارید.
	قسمت دهانی جت اسپیسر را داخل دهان و بین دندان ها قرار داده و با لبها قسمت دهانی آن را بگیرید. حال به صورت عمیق و آهسته عمل دم را انجام دهید.

*حال میتوانید یک بازدم معمولی انجام دهید (هنگام انجام بازدم، دستگاه جلوی دهانتان نباشد).

سپس درپوش دهانی دستگاه را روی آن قرار دهید.

*اگر نیاز است که یک پاف دیگر نیز استفاده کنید، بین دو پاف ۳۰ تا ۶۰ ثانیه فاصله باشد.

*اگر اسپری شما حاوی داروی کورتونی است بهتر است بعد از انجام تمام پاف ها، دهان را با آب بشوید و آب را دور بریزید (قورت ندهید).

*اگر قرار است که از یک داروی استنشاقی دیگر نیز استفاده کنید، حداقل ۵ تا ۱۰ دقیقه بین دو دارو فاصله باشد.

تهیه کننده: هیات علمی داروسازی بالینی بخش ریه- واحد آموزش سلامت



نحوه استفاده از جت اسپیسر:



تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ کد پمفلت: PA-06-1022 شماره بازنگری: ۰۰

	محفظه دارو را به دستگاه جت اسپیسر متصل کنید.
	یک بار اسپری را فشار دهید.
	یک بازدم عمیق انجام دهید (هنگام انجام بازدم، اسپری جلوی دهانتان نباشد).
	درپوش دهانی جت اسپیسر را بردارید.
	قسمت دهانی جت اسپیسر را داخل دهان و بین دندان ها قرار داده و با لبها قسمت دهانی آن را بگیرید. حال به صورت عمیق و آهسته عمل دم را انجام دهید.

*حال میتوانید یک بازدم معمولی انجام دهید (هنگام انجام بازدم، دستگاه جلوی دهانتان نباشد).

سپس درپوش دهانی دستگاه را روی آن قرار دهید.

*اگر نیاز است که یک پاف دیگر نیز استفاده کنید، بین دو پاف ۳۰ تا ۶۰ ثانیه فاصله باشد.

*اگر اسپری شما حاوی داروی کورتونی است بهتر است بعد از انجام تمام پاف ها، دهان را با آب بشوید و آب را دور بریزید (قورت ندهید).

*اگر قرار است که از یک داروی استنشاقی دیگر نیز استفاده کنید، حداقل ۵ تا ۱۰ دقیقه بین دو دارو فاصله باشد.

تهیه کننده: هیات علمی داروسازی بالینی بخش ریه- واحد آموزش سلامت