






نحوه استفاده از نبولایزر:



تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ کد پمفلت: PA-06-1024 شماره بازنگری: ۰۰

	قبل از استفاده، دست ها را با آب و صابون بشویید.
	دستگاه را روی یک سطح محکم و مطمئن قرار دهید.
	درب پلاستیکی محفظه دارو را باز کرده و دارو را طبق میزان تجویز شده در جای مخصوص که در دستگاه تعبیه شده است خالی کنید.
	محفظة دارو را به قطعه دهانی یا ماسک وصل کنید.
	لوله پلاستیکی مخصوص انتقال دارو را از یک طرف به بخش محتوی دارو و از طرف دیگر به خروجی هوای دستگاه وصل کنید.
	قسمت دهانی یا ماسک مخصوص را بر روی صورت بیمار قرار دهید. دقت کنید که قسمت دهانی را بین دندان ها قرار داده و لب ها آن را بگیرید.
	دستگاه را روشن نموده و از بیمار بخواهید تا اتمام محتوی دارویی، با دهان خود، دم عمیق و آهسته انجام دهید. این کار ممکن است ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول بکشد.

پس از اتمام محتوی دارویی دستگاه را خاموش کنید.

بخش محتوی دارو و قسمت دهانی را بشوید و در معرض هوا قرار دهید تا خشک شود.



تهیه کننده: هیات علمی داروسازی بالینی بخش ریه- واحد آموزش سلامت



نحوه استفاده از نبولایزر:



تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ کد پمفلت: PA-06-1024 شماره بازنگری: ۰۰

	قبل از استفاده، دست ها را با آب و صابون بشویید.
	دستگاه را روی یک سطح محکم و مطمئن قرار دهید.
	درب پلاستیکی محفظه دارو را باز کرده و دارو را طبق میزان تجویز شده در جای مخصوص که در دستگاه تعبیه شده است خالی کنید.
	محفظة دارو را به قطعه دهانی یا ماسک وصل کنید.
	لوله پلاستیکی مخصوص انتقال دارو را از یک طرف به بخش محتوی دارو و از طرف دیگر به خروجی هوای دستگاه وصل کنید.
	قسمت دهانی یا ماسک مخصوص را بر روی صورت بیمار قرار دهید. دقت کنید که قسمت دهانی را بین دندان ها قرار داده و لب ها آن را بگیرید.
	دستگاه را روشن نموده و از بیمار بخواهید تا اتمام محتوی دارویی، با دهان خود، دم عمیق و آهسته انجام دهید. این کار ممکن است ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول بکشد.

پس از اتمام محتوی دارویی دستگاه را خاموش کنید.

بخش محتوی دارو و قسمت دهانی را بشوید و در معرض هوا قرار دهید تا خشک شود.

تهیه کننده: هیات علمی داروسازی بالینی بخش ریه- واحد آموزش سلامت