




مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

داروی کلوزاپین



ویژه: بیماران و همراهیان

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۱/۱۸

کد پمفلت: PA-۳۲-۱۰۲۱

شماره بازنگری: ۰۱

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش سایکوسوماتیک - واحد آموزش سلامت

* در مدت زمان مصرف این دارو، از قرار گرفتن طولانی مدت بیمار در هوای گرم خودداری شود و توصیه می شود بیمار به میزان کافی مایعات استفاده کند.

* جهت کاهش یبوست از مایعات، سبزی و میوه به میزان کافی استفاده شود و تحرک و فعالیت های ورزشی افزایش داده شود.

* قطع مصرف کلوزاپین باید به صورت تدریجی (طی یک دوره ۱ تا ۲ هفته ای) انجام شود.

* این دارو ممکن است باعث بالا رفتن قند خون شود، بیمار باید از نظر علائم افزایش قند خون (پرنوشی، پرادراری، پرخوری و ضعف) بررسی شود.

منبع:

کتاب دارونامه رسمی ایران - ویرایش نهم ۱۴۰۲ مولف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان غذا و دارو نویسندگان: دکتر مژگان مشایخی و همکاران

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

* داروی کلوزاپین در بیماران زیر منع مصرف دارد:

- بیماران مبتلا به تشنج کنترل نشده

- بیماران مبتلا به برخی بیماری های خونی

- بیماران دچار کاهش شدید گلبول سفید در اثر مصرف قبلی دارو

همچنین این دارو در بیماران با اختلال کبدی و اختلالات دستگاه قلبی و عروقی باید با احتیاط مصرف شود.

* در صورت فراموشی یک نوبت دوز دارو، به محض به یاد آوردن، باید دوز فراموش شده مصرف شود. اما اگر تقریباً زمان نوبت بعدی رسیده است، احتیاجی به مصرف دوز فراموش شده نمی باشد و هرگز میزان دارو دو برابر نشود.

* درمان با داروی کلوزاپین باید حتما در بیمارستان یا سایر مراکز درمانی شروع شود و بیمار تحت نظر قرار گیرد، زیرا یکی از عوارض جانبی این دارو کاهش شدید گلبول های سفید خون می باشد که لازم است قبل از شروع دارو و مصرف منظم آن، آزمایش خون انجام شود و گلبول های سفید خون کنترل شود و اگر نتیجه طبیعی بود آنگاه می توان مصرف دارو را شروع نمود و یا ادامه داد.

* در صورت ادامه مصرف کلوزاپین، در شش ماه اول آزمایش خون جهت بررسی گلبول های سفید هر هفته و در شش ماه دوم هر دو هفته و پس از آن هر ماه انجام می گردد. انجام آزمایش خون تا یک ماه بعد از قطع دارو الزامی است.



با آرزوی سلامتی برای شما

توجه داشته باشیم که بیماری های روحی و روانی نیز مانند بیماری های جسمی نیاز به درمان و مراقبت دارند. این مطالب به منظور آشنایی شما با مصرف داروی کلوزاپین می باشد. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان را به خوبی مدیریت نموده و یا به بیمار خود در روند درمان کمک نمایید.

آشنایی با داروی کلوزاپین (Clozapine):

کلوزاپین برای درمان اسکیزوفرنی و یا اختلالات خلقی مقاوم به درمان به کار برده می شود.

این دارو به بیمارانی داده می شود که طبق استانداردهای درمانی با داروهای دیگر مداوا نشده اند یا مقاومت نشان داده اند و یا عوارض جانبی داروها برای آن ها قابل تحمل نبوده است. معمولا این دارو بر نشانه های مثبت بیماری مانند (توهم و هذیان) و همچنین بر نشانه های منفی بیماری مانند (دوری از اجتماع)، اثر درمانی قابل توجهی دارد.

نام تجاری:

کلوزاریل (Clozaril)، لپونکس (Leponex)

اشکال دارویی:

به صورت قرص های ۲۵ و ۱۰۰ میلی گرمی موجود است.



موارد منع مصرف:

- صرع کنترل نشده، مصرف داروهای سرکوب کننده فعالیت مغز استخوان

- در صورت بارداری یا قصد بارداری به روانپزشک باید اطلاع داده شود.

- در صورت شیردهی، قبل از مصرف دارو به پزشک معالج اطلاع داده شود.

عوارض جانبی:

کلوزاپین مانند بسیاری از داروهای دیگر علاوه بر مزایای درمانی ممکن است عوارضی هم داشته باشد که این عوارض همیشه و در تمامی افراد ظاهر نمی شود و اگر هم بروز پیدا کند، همیشه خطرناک و جدی نیستند.

روانپزشک زمانی این دارو را تجویز می کند که منافع آن ها بسیار بیشتر از عوارضش باشد. عوارض جانبی ماندگار و دائمی نیستند، موقتی بوده و نشان دهنده تأثیر دارو نیز می باشد. بسیاری از عوارض دارویی قابل درمان هستند و نیازی به قطع دارو نیست و در اولین فرصت باید با پزشک مشورت شود.

از عوارض این دارو: خواب آلودگی، افزایش بزاق، سرگیجه، افزایش ضربان قلب، کاهش فشارخون، یبوست، تهوع، افزایش وزن، افزایش تری گلیسیرید، افزایش قندخون، تعریق، بیقراری، تشنج و کاهش شدید گلبول سفید می باشد.



تداخل کلوزاپین با سایر داروها:

- کلوزاپین با برخی از داروها تداخل جدی دارد. در صورت استفاده از داروهای دیگر حتما به پزشک معالج اطلاع داده شود. از مصرف هرگونه داروی دیگر به صورت خودسرانه خودداری شود.

- سیگار کشیدن سطح خونی کلوزاپین را کاهش می دهد و باعث کم شدن اثر درمانی دارو می شود.

- مصرف داروی کلوزاپین با داروهای کاهش دهنده فشارخون، ممکن است باعث افت شدید فشارخون گردد.

مسمومیت و درمان:

در صورت بروز علائمی از قبیل تب، گلو درد شدید، خستگی، تپش قلب و ناتوانی در تنفس باید سریعاً به پزشک معالج اطلاع داده شود.

نکات قابل توجه در مصرف دارو

* این دارو پس از مصرف طولانی مدت نباید بدون اجازه پزشک قطع شود، زیرا نشانه های بیماری ممکن است عود کند.

* در تمام مدت مصرف دارو از نوشیدن الکل پرهیز شود، مصرف الکل و این دارو باعث خواب آلودگی و کاهش سطح هوشیاری می شود.

