




داروی هالوپریدول



ویژه: بیماران و همراهیان

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۱/۱۸

کد پمفلت: PA-۳۲-۱۰۱۵

شماره بازنگری: ۰۵

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش سایکوسوماتیک - واحد آموزش سلامت

در چه صورتی باید به پزشک مراجعه کنید؟

در صورت بروز تب، سفت شدن عضلات، تفکر غیر طبیعی، سردرگمی و گیجی، تند شدن و یا نامنظم شدن ضربان قلب سریعاً به پزشک معالج مراجعه کنید.



منبع:

کتاب دارونامه رسمی ایران - ویرایش نهم ۱۴۰۲ مولف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان غذا و دارو نویسندگان: دکتر مژگان مشایخی و همکاران

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

* از قرار گرفتن بیش از حد در برابر آفتاب خودداری کنید و از لوسیون های محافظ نور خورشید، عینک آفتابی و پوشش کامل استفاده کنید.

* کم شدن بزاق به خصوص در بیماران سالمند باعث خشکی دهان، پوسیدگی دندان و بیمارهای لثه و دهان می شود، بنابراین حفظ بهداشت دهان، مسواک زدن و استفاده از نخ دندان توصیه می شود.

* برای کاهش یبوست ناشی از دارو، به مقدار کافی مایعات، میوه و سبزی مصرف نمایید و تحرک و فعالیت های ورزشی خود را افزایش دهید.



* در صورت فراموش کردن یک دوز دارو از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری کنید.

* دوره درمان را کامل کنید، برای رسیدن به اثرات درمانی مناسب ممکن است هفته ها زمان لازم باشد.

* مصرف دارو را زودتر از زمان مقرر و بدون نظر پزشک قطع نکنید.



توجه داشته باشیم که بیماری‌های روحی و روانی نیز مانند بیماری‌های جسمی نیاز به درمان و مراقبت دارند. این مطالب به منظور آشنایی شما با مصرف داروی هالوپریدول می‌باشد. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان را به خوبی مدیریت نموده و یا به بیمار خود در روند درمان کمک نمایید.

هالوپریدول (Haloperidol)

موارد مصرف:

هالوپریدول از دسته داروهای ضد سایکوز می‌باشد. از نوع تزریقی آن در موارد پرخاشگری شدید استفاده می‌شود. این دارو برای کنترل علائم بسیاری از اختلالات از جمله اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو در کوتاه نمودن دوره بیماری و کم کردن علائم و جلوگیری از حملات بعدی موثر می‌باشد.

نام تجاری و اشکال دارویی:

هالدول (Haldol)

هالوپریدول به صورت قرص (۵/۰ و ۵ میلی گرمی) و قطره در دسترس می‌باشد.

موارد منع مصرف:

* در افراد زیر ۳ سال



* بانوان محترم باید در صورت بارداری به پزشک اطلاع دهید.
* بانوان همچنین در زمان شیردهی، قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت نمایند.

عوارض جانبی:

هالوپریدول مانند بسیاری از داروهای دیگر علاوه بر مزایای درمانی ممکن است عوارضی هم داشته باشد که این عوارض همیشه و در تمامی افراد ظاهر نمی‌شود و اگر هم بروز پیدا کند همیشه خطرناک و جدی نیستند.

روانپزشک زمانی این دارو را تجویز می‌کند که منافع آن‌ها بسیار بیشتر از عوارضش باشد.

عوارض جانبی دارو تغییرات فیزیولوژیک ماندگار و دائمی نیستند، بلکه بعثت حضور فعال دارو در بدن، موقتی بوده و نشان دهنده تاثیر دارو نیز می‌باشد. بسیاری از عوارض دارویی قابل درمان هستند و نیازی به قطع دارو نیست ولی در اولین فرصت باید با پزشک مشورت شود.

* ممکن است در برخی از افراد اشکال در بلع ایجاد شود.

* در بعضی بیماران انقباض و گرفتگی عضلات که به صورت کج شدن گردن و ستون فقرات به همراه درد بروز می‌کند.

* اشکال در صحبت کردن، اشکال در بلع، کشیدن پا به زمین به هنگام راه رفتن، سختی عضلات ساق پا و بازوها ممکن است به وجود بیاید.



* احتباس ادرار و مدفوع، تاری دید، افزایش وزن، خواب آلودگی، واکنش‌های حساسیتی پوستی، یبوست و کاهش میل جنسی از عوارض احتمالی دارو می‌باشد.

تداخل هالوپریدول با سایر داروها:

* مصرف بعضی از داروها به همراه هالوپریدول باعث کاهش یا افزایش اثر دارو می‌شود. لذا لازم است قبل از مصرف هر گونه دارو با پزشک مشورت کنید.

* مصرف همزمان هالوپریدول با الکل، برخی داروهای ضد درد، داروهای مخدر و آرام بخش‌ها موجب خواب آلودگی بیش از حد، تنفس نامناسب و افت فشار خون می‌شود.

نکات قابل توجه در مصرف دارو:

* این دارو باید با نظر پزشک مصرف شود. از افزایش یا کاهش و یا قطع آن بدون نظر پزشک خودداری شود.

* دارو می‌تواند همراه با غذا و یا با معده خالی و یک لیوان آب میل شود. در صورت بروز مشکلات گوارشی بهتر است همراه غذا مصرف شود.

* هنگام رانندگی یا انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارد، احتیاط کنید. زیرا با مصرف دارو امکان بروز خواب آلودگی وجود دارد.

* از تماس محلول‌های خوراکی هالوپریدول با پوست جلوگیری نمایید زیرا می‌تواند باعث واکنش‌های پوستی شود.

