



در چه صورتی باید به پزشک مراجعه کنید؟

اگر علائمی مانند از هوش رفتن و مشکلات تنفسی را مشاهده کردید سریعاً با فوریت‌های پزشکی تماس بگیرید.

علائم مصرف بیش از حد این دارو می‌تواند شامل خواب‌آلودگی شدید، حرکات غیر طبیعی مردمک چشم و از دست دادن هوشیاری باشد.



منبع:

کتاب دارونامه رسمی ایران - ویرایش نهم ۱۴۰۲ مولف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان غذا و دارو نویسندگان: دکتر مژگان مشایخی و همکاران

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می‌توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰
وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

* در بیماران با نارسایی کبد، کلیه و یا قلب با احتیاط مصرف گردد.

* در صورت بروز تب، بثورات جلدی، علائم شبه آنفلوانزا، تورم غدد لنفاوی یا تشنج حتماً به پزشک مراجعه شود.

* مصرف داروی لاموتریزین در دوران بارداری ممکن است خطر ایجاد شکاف لب و شکاف کام را در نوزاد افزایش دهد.

* بانوان محترم اگر تصمیم به بارداری دارند یا در طی دوره مصرف دارو باردار شدند به پزشک خود اطلاع دهند.

* به دلیل ترشح دارو در شیر مادر، مصرف دارو در شیردهی توصیه نمی‌شود.



داروی لاموتریزین



ویژه: خانواده بیمار

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۱/۱۸

کد پمفلت: PA-۳۲-۱۰۱۳

شماره بازنگری: ۰۵

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش سایکوسوماتیک - واحد آموزش سلامت



توجه داشته باشیم که بیماری های روحی و روانی نیز مانند بیماری های جسمی نیاز به درمان و مراقبت دارند. این مطالب به منظور آشنایی شما با مصرف داروی لاموتریزین می باشد. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان را به خوبی مدیریت نموده و یا به بیمار خود در روند درمان کمک نمایید.

داروی لاموتریزین:

لاموتریزین یک داروی ضد تشنج با اثر ضد افسردگی است که به تنهایی یا همراه با دیگر داروهای ضد تشنج برای درمان صرع تجویز می گردد. همچنین گاهی دارو به عنوان درمان نگهدارنده در اختلال دو قطبی مصرف می شود.

اشکال دارویی:

به صورت قرص های ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرمی می باشد.

تداخل دارویی:

* سدیم والپروات اثر لاموتریزین را افزایش می دهد، اگر این دو دارو با هم مصرف شوند باید مقدار لاموتریزین را با نظر پزشک کاهش داد.

* کاربامازپین می تواند مقدار لاموتریزین را در خون کاهش دهد، اما لاموتریزین عوارض جانبی کاربامازپین را تشدید می کند.

* فنی توئین و فنوباربیتال مقدار لاموتریزین را در خون



کاهش می دهد، لذا باید طبق دستور پزشک مقدار بیشتری لاموتریزین مصرف شود.

برخی از عوارض جانبی لاموتریزین:

لاموتریزین برخی عوارض جزئی دارد که بیشتر آنها با تنظیم مقدار دارو برطرف می شوند.

لاموتریزین ممکن است موجب بروز بثورات پوستی بخصوص طی شش هفته اول درمان شود.

اگرچه بثورات پوستی ممکن است با ادامه درمان برطرف شود ولی آن را فوراً به پزشک اطلاع دهید، زیرا ممکن است قطع مصرف دارو ضروری باشد.



بثورات جلدی، تب، علائم شبه آنفلوآنزا، خواب آلودگی، اختلال در عملکرد کبد، کاهش میزان پلاکت خون، حساسیت به نور، اختلالات بینایی، گیجی، عدم تعادل، خستگی، اختلالات گوارشی و تحریک پذیری از عوارض جانبی این دارو هستند.



البته لازم به ذکر است که اغلب این عوارض، در ابتدای درمان با دارو دیده می شود و به مرور نسبت به آنها تحمل ایجاد می شود.

اگر در مصرف داروها مشکلی دارید،

حتماً آن را با پزشک در میان بگذارید.

نکات قابل توصیه:

* از قطع ناگهانی مصرف این دارو باید پرهیز شود. قطع مصرف دارو باید به تدریج حداقل طی ۲ هفته انجام شود.

* دوره درمان با دارو باید کامل شود، این دارو نباید بیشتر از مقدار تجویز شده مصرف شود.

* در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرفی دارو، به محض به یاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی نزدیک است، از دو برابر کردن مقدار مصرفی پرهیزید.

* به منظور بررسی پیشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشک ضروری است. به علت بروز تاری دید، سرگیجه و خواب آلودگی، هنگام رانندگی یا کار با ماشین که نیاز به هوشیاری دارند باید احتیاط گردد.

* در صورت نیاز به آزمایشات پزشکی در حین مصرف دارو، حتماً به انجام دقیق آنها توجه داشته باشید.

