



داروی الانزاپین



ویژه: بیماران و همراهیان

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۱/۱۸

کد پمفلت: PA-۳۲-۱۰۱۸

شماره بازنگری: ۰۱

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.




معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش سایکوسوماتیک - واحد آموزش سلامت

نشانه‌های بیمار بعد از چهار هفته بهبود نیافت به پزشک معالج اطلاع داده شود.

* الانزاپین ممکن است باعث افزایش قند خون گردد. نشانه‌ها شامل: تشنگی مفرط، افزایش ادرار، تهوع و استفراغ، خواب آلودگی، خشکی پوست و خشکی دهان می‌باشد.

* در افراد دیابتی مصرف الانزاپین، باید با کنترل منظم قند خون باشد.



منبع:

کتاب دارونامه رسمی ایران - ویرایش نهم ۱۴۰۲ مولف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان غذا و دارو نویسندگان: دکتر مژگان مشایخی و همکاران

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می‌توانید بصورت **رایگان** همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

⇐ در هنگام مصرف این دارو، دارو زودتر از موعد مقرر و بدون نظر پزشک قطع نشود.

⇐ بیمار را از نظر بروز تب، سفتی عضلانی و اختلال سطح هوشیاری کنترل کرده و در صورت بروز هر کدام از عوارض پزشک معالج رو مطلع نمایید.

مسمومیت و درمان:

مصرف بیش از حد این دارو باعث خواب آلودگی و اختلال تکلم می‌شود.

لازم است بیماران از نظر افت فشارخون، کما و تشنج کنترل شوند.

ملاحظات حین مصرف دارو:

* این دارو باید طبق دستور پزشک مصرف شود.

* هرگز این دارو بیشتر از مقدار و مدت تجویز شده مصرف نشود.

* از مصرف این دارو در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری شود.

* این دارو باید با لیوان پر از آب مصرف شود.

* معمولاً حدود ۴ هفته طول می‌کشد تا دارو اثر کند، اگر



توجه داشته باشیم که بیماری های روحی و روانی نیز مانند بیماری های جسمی نیاز به درمان و مراقبت دارند. این مطالب به منظور آشنایی شما با مصرف داروی الانزاپین می باشد. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان را به خوبی مدیریت نموده و یا به بیمار خود در روند درمان کمک نمایید.

داروی الانزاپین (Olanzapine):

این دارو از گروه داروهای ضدروانپریشی (ضد سایکوز) است.

موارد مصرف:

این دارو برای درمان بی ثباتی خلق و روانپریشی (اختلالات سایکوتیک) به کار برده می شود و در کوتاه نمودن دوره بیماری، کم کردن علائم و جلوگیری از حملات بعدی مؤثر می باشد و در بیماران مبتلا به سایکوز مقاوم به درمان (حاد و شدید) کاربرد دارد.

نام تجاری دارو:

زیپراکس (Zyprexa)

اشکال دارویی:

این دارو به صورت قرص های ۵، ۲، ۵ و ۱۰ میلی گرم موجود است.



موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو

عوارض جانبی:

الانزاپین مانند بسیاری از داروهای دیگر علاوه بر مزایای درمانی ممکن است عوارضی هم داشته باشد که این عوارض همیشه و در تمامی افراد ظاهر نمی شود و اگر هم بروز پیدا کند، همیشه خطرناک و جدی نیستند.

روانپزشک زمانی این دارو را تجویز می کند که منافع آنها بسیار بیشتر از عوارضش باشد. عوارض جانبی تغییراتی ماندگار و دائمی نیستند و به علت حضور ماده ای فعال در بدن ایجاد شده که موقتی بوده و نشان دهنده تأثیر دارو نیز می باشد.

بسیاری از عوارض دارویی برگشت پذیر و قابل درمان هستند و نیازی به قطع دارو نیست و در اولین فرصت باید با پزشک مشورت شود.

این عوارض شامل: بی خوابی، افزایش وزن، سردرد، یبوست خصوصاً در مصرف طولانی مدت، افزایش آنزیم های کبدی، افزایش سطح پرولاکتین و کاهش گلبول های سفید خون است.

تداخل الانزاپین با سایر داروها:

مصرف بعضی از داروها به همراه الانزاپین باعث کاهش یا افزایش اثر دارو می شود، لذا لازم است قبل از مصرف هرگونه دارو با پزشک مشورت شود.

به عنوان مثال این دارو اثر داروی لودوپا را تشدید می کند.



نکات قابل توجه در مصرف دارو:

قبل و در حین مصرف داروی الانزاپین پزشکان آزمایش قند و چربی خون تجویز می نمایند و وزن فرد را مرتب کنترل می کنند. در مورد راه های جلوگیری از افزایش وزن بدن مانند رژیم غذایی سالم و ورزش با پزشک معالج صحبت شود.

در صورت بروز علائم افزایش قندخون شامل مواردی مانند: احساس تشنگی مفرط، تکرر ادرار، گرسنگی بیش از حد، خستگی یا ضعف مفرط به پزشک معالج اطلاع داده شود.

از تغییر وضعیت ناگهانی یعنی سریع بلند شدن از حالت خوابیده یا نشسته پرهیز شود زیرا ممکن است باعث سقوط فرد شود.

هنگام رانندگی یا انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارد احتیاط کنید زیرا با مصرف دارو امکان بروز خواب آلودگی وجود دارد.

بانوان محترم در زمان بارداری و یا شیر دهی، قبل از مصرف دارو، با پزشک خود مشورت نمایند.

