



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

داروی کوئتیپاین



ویژه: بیماران و همراهیان

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۱/۱۸

کد پمفلت: PA-۳۲-۱۰۱۲

شماره بازنگری: ۰۵

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش سایکوسوماتیک - واحد آموزش سلامت

* ترجیحاً دارو را در عصر قبل از غذا یا همراه با یک وعده غذای سبک مصرف نمایید.

* مصرف این دارو را با لیوانی پر از آب فراموش نکنید.



* کوئتیپاین مجوزهای لازم برای مصرف در همه کودکان را ندارد و در صورت تجویز آن برای کودکان با پزشک او صحبت کنید و از صحت تجویز آن اطمینان حاصل نمایید.

منبع:

کتاب دارونامه رسمی ایران - ویرایش نهم ۱۴۰۲ مولف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان غذا و دارو نویسندگان: دکتر مژگان مشایخی و همکاران

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

اگر با مصرف داروها مشکلی دارید، حتماً آن را با پزشک خود در میان بگذارید.

موارد احتیاط:

* هنگام رانندگی یا انجام کارهایی که به هوشیاری و آگاهی نیاز دارد، احتیاط کنید.

* از تغییر وضعیت ناگهانی یعنی بلند شدن سریع از حالت نشسته یا خوابیده پرهیز کنید، زیرا ممکن است باعث سرگیجه و سقوط شود.

* از نوشیدن الکل اجتناب کنید، زیرا می تواند عوارض جانبی این دارو را افزایش دهد.

* داروهای سرما خوردگی، مخدرها (نارکوتیک ها) قرص های خواب آور، داروهای شل کننده عضلانی، داروهای ضد صرع و اضطراب ممکن است خواب آلودگی ناشی از مصرف این دارو را افزایش دهند.

* اگر شما به طور منظم از این داروها و یا هر داروی دیگری استفاده می کنید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.



با آرزوی سلامتی برای شما

توجه داشته باشیم که بیماری‌های روحی و روانی نیز مانند بیماری‌های جسمی نیاز به درمان و مراقبت دارند. این مطالب به منظور آشنایی شما با مصرف داروی کوئتیاپین می‌باشد. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان را به خوبی مدیریت نموده و یا به بیمار خود در روند درمان کمک نمایید.

❧ داروی کوئتیاپین:

کوئتیاپین (با نام تجاری ترانکوپین) یک داروی ضد سایکوز است که برای درمان اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی همراه با یک داروی ضد افسردگی برای درمان اختلال افسردگی تایید شده است.

این دارو به صورت قرص‌های ۲۵، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرمی در دسترس می‌باشد.



❧ راهنمای مصرف داروی کوئتیاپین:

- * این دارو را کاملاً طبق دستور پزشک مصرف کنید.
- * هرگز این دارو را بیشتر از مقدار و مدت تجویز شده مصرف نکنید.
- * پزشک شما ممکن است برای اینکه بهترین نتیجه را بگیرید، دوز داروی شما را تغییر دهد.
- * این دارو را با لیوانی پر از آب مصرف کنید.
- * از له کردن، جویدن و شکستن قرص اجتناب کنید.
- * قرص را به صورت کامل بلعید.
- * کوئتیاپین را در مکانی به دور از رطوبت و گرما قرار دهید و از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- * شما نباید به‌طور ناگهانی استفاده از این دارو را متوقف کنید. توقف ناگهانی مصرف این دارو ممکن است وضعیت ابتلای شما را بدتر کند.

❧ فراموش کردن دوز مصرفی:

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن آن دارو را میل کنید. اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرار سیده باشد فقط آن نوبت را مصرف کنید و از دو برابر کردن دارو خودداری کنید.



❧ تداخلات دارویی:

کوئتیاپین با داروهایی چون سایمتیدین، لورازپام، ریفامپین، آنتی بیوتیک‌ها، فلوکستین، هالوپریدول، ایمی پرامین، داروهای درمان فشار خون بالا یا بیماری‌های قلبی، داروهای ضد تشنج مانند: فنوباریتال و فنی توئین تداخل دارویی دارد. البته ممکن است داروهای دیگری نیز وجود داشته باشند که با کوئتیاپین تداخل پیدا کنند.

درباره تمام داروهای بدون نسخه و یا نسخه ای که مصرف می‌کنید به پزشک خود اطلاع دهید. این توصیه تمام داروهای بدون نسخه، داروهای گیاهی، ویتامین‌ها و دیگر داروها را نیز در بر میگیرد. هیچ داروی جدیدی را بدون مشورت با پزشک خود مصرف نکنید.

❧ عوارض جانبی:

واکنش‌های آلرژیک مانند کهیر، مشکلات تنفسی، تورم صورت، لبها، زبان و گلو، تغییرات خلقی یا رفتاری، اضطراب، حملات هراس، مشکلات خواب، پرخاشگری، بیقراری، بیش فعالی (جسمی- روانی) و افسردگی شدید می‌تواند در مصرف این دارو ایجاد شود.

البته لازم به ذکر است که اغلب این عوارض، در ابتدای درمان با دارو دیده می‌شود و به مرور نسبت به آنها تحمل ایجاد می‌شود.

