



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

داروی ریسپریدون



ویژه: بیماران و همراهیان

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۱/۱۸

کد پمفلت: PA-۳۲-۱۰۱۱

شماره بازنگری: ۰۵

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش سایکوسوماتیک - واحد آموزش سلامت

* برای بهبود نشانه های بیماری حداقل چند هفته باید به مصرف دارو ادامه دهید و برای کسب نتایج درمانی مطلوب، دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید.

* به دنبال مصرف دارو ممکن است افزایش قند خون رخ دهد. اگر مبتلا به دیابت هستید، قند خون را قبل از مصرف دارو و سپس به صورت دوره ای چک کنید. علائم دیابت پرنوشی، پرادراری، پرخوری و ضعف را در نظر داشته باشید و در صورت بروز هر کدام از این علائم، قند خون ناشتا را اندازه گیری نمایید و به اطلاع پزشک معالج برسانید.

* در صورت فراموش کردن یک دوز دارو، به محض به خاطر آوردن دوز فراموش شده آن را مصرف کنید. اما اگر تقریباً زمان نوبت بعدی رسیده است، از دو برابر کردن دارو بپرهیزید.

منبع:

کتاب دارونامه رسمی ایران - ویرایش نهم ۱۴۰۲ مولف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان غذا و دارو نویسندگان: دکتر مژگان مشایخی و همکاران

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

مسمومیت و درمان:

مصرف بیش از حد دارو باعث تشدید اثرات دارو مانند آرام بخشی، گیجی، تاکیکاردی و افت فشار خون می شود.

بهتر است در صورت مصرف بیش از مقدار تجویز شده با مراقبت های پزشکی اورژانس، تماس بگیرید.

نکات قابل توجه در مصرف دارو:

* ریسپریدون ممکن است باعث ایجاد احساس سرگیجه خصوصاً هنگام تغییر وضعیت ناگهانی شود. در صورت بروز این حالت، به آرامیو در صورت نداشتن سرگیجه از موقعیت خوابیده یا نشسته به ایستاده تغییر وضعیت دهید.

* ریسپریدون می تواند حالت خواب آلودگی ایجاد کند، بنابراین تا زمان مشخص شدن میزان تاثیر آن در بدن از رانندگی یا انجام کارهایی که نیاز به دقت دارند پرهیز کنید.

* دارو را می توانید همراه غذا و یا ناشتا مصرف کنید.

* دارو را در دمای معمولی اتاق دور از رطوبت، نور مستقیم و حرارت زیاد نگهداری کنید.

* قرص ها را باید بطور کامل بلعید و از جویدن یا خرد کردن آن خودداری کنید.

* الکل حالت خواب آلودگی و گیجی این دارو را تشدید می کند، لذا از نوشیدن الکل پرهیز کنید.



توجه داشته باشیم که بیماری های روحی و روانی نیز مانند بیماری های جسمی نیاز به درمان و مراقبت دارند. این مطالب به منظور آشنایی شما با مصرف داروی ریسپریدون می باشد. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان را به خوبی مدیریت نموده و یا به بیمار خود در روند درمان کمک نمایید.

ریسپریدون (Risperidone)

موارد مصرف:

ریسپریدون در درمان برخی از بیمارهای روانپزشکی مانند اسکیزوفرنی استفاده می شود. به علاوه، در درمان بی قراری اختلال اوتیسم در کودکان ۵-۱۷ سال و برخی اختلالات اضطرابی و اختلالات حرکتی، نیز مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این دارو در کوتاه نمودن دوره بیماری و کم کردن علائم و جلوگیری از حملات بعدی موثر می باشد.

اشکال دارویی: قرص ۰/۲۵ - ۰/۵ - ۱ - ۲ - ۳ و ۴ میلی گرمی

موارد منع مصرف:

در بیماران دچار سرطان سینه، بیمارهای قلبی عروقی، سابقه سکته قلبی، مشکلات عروقی، مغز و بیماری های شدید کبدی یا کلیوی و پارکینسون قبل از مصرف دارو باید با پزشک مشورت کنید و همچنین بانوان در صورت بارداری یا قصد باردار شدن و شیر دهی، حتما با پزشک مشورت کنند.



نام تجاری

ریسپردال (Risperdal)



عوارض جانبی:

ریسپریدون مانند بسیاری از داروهای دیگر علاوه بر مزایای درمانی ممکن است عوارضی هم داشته باشد که این عوارض همیشه و در تمامی افراد ظاهر نمی شود و اگر هم بروز پیدا کند همیشه خطرناک و جدی نیستند. روانپزشک زمانی این دارو را تجویز می کند که منافع آن بسیار بیشتر از عوارضش باشد. عوارض جانبی تغییرات فیزیولوژیک ماندگار و دائمی نیستند بلکه به علت حضور فعال دارو که در بدن ایجاد شده، موقتی بوده و نشان دهنده تاثیر دارو نیز می باشد. بسیاری از عوارض دارویی قابل درمان هستند و نیازی به قطع دارو نیست و در اولین فرصت باید با پزشک مشورت شود.

برخی از عوارض جانبی ریسپریدون:

سردرد، خواب آلودگی، سرگیجه، احساس سبکی سر، اضطراب، بیقراری، مشکل درحافظه یا تمرکز، تحریک پذیری، اشکالات خواب، خشکی دهان، ناراحتی معده، اسهال، یبوست، سوزش سر دل، افزایش وزن، گلودرد، سرفه، آبریزش بینی، بثورات جلدی، حساسیت به نور، کاهش میل جنسی، تورم پستان ها و یا ترشح از آن ها، افزایش خونریزی قاعدگی و مشکل در دفع ادرار و افزایش ترشح بزاق بخصوص آبریزش از دهان در زمان خواب



توجه داشته باشید که این عوارض در همه افراد بروز نمی کند. پس جای نگرانی وجود ندارد.

تداخل ریسپریدون با سایر داروها:

ریسپریدون با برخی از داروها تداخل دارد. در صورت استفاده از داروهای دیگر حتما با پزشک خود مشورت کنید. از مصرف هرگونه داروی دیگر به صورت خودسرانه خودداری نمایید.

لطفا به موارد زیر توجه نمایید:

* مصرف همزمان ریسپریدون با داروهای کاهش دهنده فشار خون می تواند موجب کاهش شدید فشار خون گردد.
* مصرف همزمان ریسپریدون با داروهای ضد افسردگی، آنتی هیستامین، آرام بخش ها و ضد دردهای حاوی مخدر، اثرات جانبی این داروها را افزایش می دهد.

در صورت مصرف هر کدام از داروهای زیر،

باید به پزشک اطلاع دهید:

کاربامازپین، فنی توئین، فنوباریتال، فلوکستین، ریفامپین و داروهایی که برای درمان بیماری پارکینسون استفاده می شود مانند: لوودوپا
همچنین در صورت ابتلا به بیماری دیابت و یا داشتن سابقه خانوادگی دیابت و مشکلات کبدی و کلیوی پزشک را مطلع کنید.

