

- تداخلات دارویی ممکن است عملکرد و تأثیر داروها را تغییر دهد، هنگام مصرف این دارو تمام داروهایی که توسط بیمار مصرف می‌شود اعم از (گیاهی، مکمل و ...) به اطلاع پزشک معالج رسانده شود.

- برخی داروها که با سرتراپین تداخل دارند: پیموزاید، داروهای ضدالتهاب مانند ایبوپروفن، رقیق کننده‌های خون مثل وارفارین و آسپرین

- داروهایی که باعث خواب آلودگی می‌شوند: مانند آنتی هیستامین ها، ضد اضطراب‌ها، شل کننده های عضلانی و بعضی مسکن ها

نکات قابل توجه در مصرف دارو:

* بدون مشورت پزشک دارو قطع نشود، زیرا نشانه های بیماری ممکن است دوباره عود کند.

* دوز دارو از فردی به فرد دیگر متفاوت است، توصیه می‌شود دارو طبق تجویز پزشک استفاده شود.



* در صورت فراموشی یک نوبت دوز دارو، به محض به یاد آوردن، باید دوز فراموش شده مصرف شود. اما اگر تقریباً زمان نوبت بعدی رسیده است، احتیاجی به مصرف دوز فراموش شده نمی‌باشد و هرگز میزان دارو دو برابر نشود.



منبع:

کتاب دارونامه رسمی ایران - ویرایش نهم ۱۴۰۲ مولف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان غذا و دارو نویسندگان: دکتر مژگان مشایخی و همکاران

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت **رایگان** همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰
وبسایت: emamreza.mums.ac.ir



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

داروی سرتراپین



ویژه: بیماران و همراهیان

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۱/۱۸

کد پمفلت: PA-۳۲-۱۰۲۰

شماره بازنگری: ۰۱

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش سایکوسوماتیک - واحد آموزش سلامت

با آرزوی سلامتی برای شما

توجه داشته باشیم که بیماری های روحی و روانی نیز مانند بیماری های جسمی نیاز به درمان و مراقبت دارند. این مطالب به منظور آشنایی شما با مصرف داروی سرتالین می باشد. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان را به خوبی مدیریت نموده و یا به بیمار خود در روند درمان کمک نمایید.

آشنایی با داروی سرتالین:

یک داروی روانپزشکی است و برای درمان افسردگی، اختلال وسواس، اختلال پانیک (وحشت زدگی)، اختلال استرس پس از سانحه، سندرم پیش از قاعدگی و اختلال اضطراب استفاده می شود.

نام تجاری:

آسنترا- زولفت

اشکال دارویی:

به شکل قرص های ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم موجود است.

داروی سرتالین متعلق به گروه دارویی مهار کننده های باز جذب سروتونین است که با افزایش فعالیت ماده شیمیایی سروتونین در مغز عمل می کند.



موارد منع مصرف داروی سرتالین:

توصیه می شود به هیچ عنوان داروی سرتالین به فرد دیگری با علائم مشابه تجویز نگردد.

در صورت بروز این موارد به پزشک معالج اطلاع داده شود: مشکلات کلیوی، مشکلات قلبی، بالا بردن فشارخون، مشکلات چشمی (مانند آب سیاه یا گلوکوم)، بارداری یا شیردهی، دیابت، تشنج و صرع

به دلیل احتمال بروز سرگیجه، اختلال در تصمیم گیری، تفکر و مهارت های حرکتی تا روشن شدن اثرات دارو، از رانندگی و کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند، پرهیز شود. در طی مصرف این دارو از مصرف الکل خودداری شود.

عوارض جانبی دارو:

سرتالین مانند بسیاری از داروهای دیگر علاوه بر مزایای درمانی ممکن است عوارضی هم داشته باشد که این عوارض همیشه و در تمامی افراد ظاهر نمی شود و اگر هم بروز پیدا کند، همیشه خطرناک و جدی نیستند.

روانپزشک زمانی این دارو را تجویز می کند که منافع آن ها بسیار بیشتر از عوارضش باشد، عوارض جانبی ماندگار و دائمی



نیستند بلکه موقتی بوده و نشان دهنده تأثیر دارو نیز می باشد. بسیاری از عوارض دارویی قابل درمان هستند و نیازی به قطع دارو نیست و در اولین فرصت باید با پزشک مشورت شود.

از عوارض این دارو سرگیجه، سردرد، خواب آلودگی، مشکلات خواب، فقدان تمرکز، کسالت، گرفتگی و پرش ناگهانی عضلات، تعریق، اسهال، سوء هاضمه، یبوست، افزایش وزن، خشکی دهان و تاری دید می باشد.

اگر هر علائم دیگری مشاهده شد که از نظر شما به علت استفاده از داروی سرتالین است، به پزشک معالج اطلاع داده شود.

