



مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع)

داروی سدیم والپروات



ویژه: بیماران و همراهان

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۱/۱۸

کد پمفلت: PA-۳۲-۱۰۱۹

شماره بازنگری: ۰۱

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: بخش سایکوسوماتیک - واحد آموزش سلامت

⇐ در هنگام مصرف این دارو به هنگام رانندگی یا انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارد احتیاط شود، زیرا امکان بروز خواب آلودگی وجود دارد.

⇐ در صورت تمایل به روزه‌داری باید با پزشک معالج مشورت شود.

⇐ در زمان مصرف دارو، دارو زودتر از موعد مقرر یا بدون نظر پزشک قطع نگردد.

⇐ هرگونه تغییر در دوز دارو باید با نظر روانپزشک معالج باشد.

منبع:

کتاب دارونامه رسمی ایران - ویرایش نهم ۱۴۰۲ مولف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان غذا و دارو نویسندگان: دکتر مژگان مشایخی و همکاران

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت **رایگان** همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

⇐ برای کاهش مشکلات گوارشی، باید قرص‌ها به صورت کامل بلعیده شود و یا همراه با غذا مصرف شود.

⇐ از مصرف محلول‌های خوارکی والپروات سدیم با نوشابه‌های گازدار خودداری شود، زیرا واکنش ایجاد شده موجب بوجود آمدن احساس و طعم نامطبوع و تحریک دهان و گلو می‌شود.

⇐ در صورتیکه بیمار دچار بیماری جسمی (خونی و کبدی) می‌باشد، قبل از مصرف والپرات سدیم حتماً به پزشک معالج اطلاع داده شود.

⇐ قبل از شروع درمان با سدیم والپروات و در شش ماه اول درمان، انجام آزمایشات کبد ضرورت دارد.

⇐ در صورت انجام آزمایش سطح خونی والپروات سدیم، تا ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش نباید از دارو استفاده شود. اما بلافاصله بعد از نمونه گیری باید دارو مصرف شود.

⇐ در صورت فراموشی یک نوبت دوز دارو، به محض به یاد آوردن، باید دوز فراموش شده مصرف شود. اما اگر تقریباً زمان نوبت بعدی رسیده است، احتیاجی به مصرف دوز فراموش شده نمی‌باشد و هرگز میزان دارو دو برابر نشود.



توجه داشته باشیم که بیماری های روحی و روانی نیز مانند بیماری های جسمی نیاز به درمان و مراقبت دارند. این مطالب به منظور آشنایی شما با مصرف داروی سدیم والپروات می باشد. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان را به خوبی مدیریت نموده و یا به بیمار خود در روند درمان کمک نمایید.

آشنایی با داروی سدیم والپروات:

سدیم والپروات یک داروی ضد تشنج است. این دارو همچنین اثرات تثبیت کننده خلق دارد و در درمان اختلال دو قطبی و میگرن نیز کاربرد دارد.

استفاده از این دارو در کوتاه نمودن دوره بیماری و کم کردن علائم و جلوگیری از حملات بعدی مؤثر می باشد.

نام تجاری:

اورلپت (Orlept)، دپاکین (Depakin)

اشکال دارویی:

این دارو به شکل قرص ۲۰۰ و ۵۰۰ میلی گرمی و شربت موجود است.

موارد منع مصرف داروها:

حساسیت به دارو، در بیماران کبدی و اختلال شدید عملکرد کبد و همچنین در هنگام ضربه به سر



- در صورت بارداری یا قصد بارداری به روانپزشک باید اطلاع داده شود.

- در صورت شیردهی، قبل از مصرف دارو به پزشک معالج اطلاع داده شود. این دارو در شیر مادر ترشح می شود به همین منظور شیردهی در دوران مصرف این دارو توصیه نمی شود.

عوارض جانبی:

سدیم والپروات مانند بسیاری از داروهای دیگر علاوه بر مزایای درمان ممکن است عوارضی هم داشته باشد که این عوارض همیشه و در تمامی افراد ظاهر نمی شود و اگر هم بروز پیدا کند، همیشه خطرناک و جدی نیست. روانپزشک زمانی این دارو را تجویز می کند که منافع آن بسیار بیشتر از عوارضش باشد. عوارض جانبی ماندگار و دائمی نیستند، عوارض موقتی بوده و نشان دهنده تأثیر دارو نیز می باشد.

- بسیاری از عوارض دارویی قابل درمان هستند و نیازی به قطع دارو نیست و در اولین فرصت باید با پزشک مشورت شود.

- این دارو ممکن است باعث دردهای خفیف شکمی شود. اسهال، تهوع، استفراغ، سوء هاضمه، سرگیجه و ضعف، تشنگی، یبوست، لرزش دست و افزایش وزن، افزایش اشتها یا بی اشتهایی از عوارض دارو می باشد.

- سدیم والپروات ممکن است باعث آسیب کبدی شود، در صورت بروز علائمی مانند درد شکمی، تهوع، بی اشتهایی و زردی پوست به پزشک اطلاع داده شود.



- مصرف همزمان این دارو با فنی توئین و فنوباریتال باعث خواب آلودگی بیش از حد می شود.

- مصرف همزمان این دارو با کاربامازپین ممکن است کنترل تشنج را کاهش دهد.

- مصرف بعضی از داروها به همراه سدیم والپروات باعث کاهش یا افزایش اثر دارو می شود لذا لازم است قبل از مصرف هرگونه دارو با پزشک مشورت شود.

نکات قابل توجه در مصرف دارو:

⇐ از مصرف همزمان سدیم والپروات با فنی توئین، فنوباریتال و کلونازپام بدون اطلاع پزشک خودداری شود.

⇐ مصرف همزمان این دارو با الکل، اثر دارو را کم می کند. همچنین ممکن است باعث کاهش سطح هوشیاری شود، لذا حتما در تمام مدت مصرف این دارو، از مصرف الکل خودداری شود.

⇐ مصرف همزمان داروهای بدون نسخه، ضد دردها و داروهای گیاهی با سدیم والپروات بایستی به اطلاع پزشک رسانده شود.

