




کیست هیداتیک کبد



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۲۰-۱۰۱۴

شماره بازنگری: ۰۱

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت
تهیه کننده: بخش جراحی - واحد آموزش سلامت

سبزیجات، صیفی جات و میوه‌های بوته دار زمینی مثل توت فرنگی از عمده ترین فاکتورهای آلودگی به تخم این انگل می‌باشند. حتما باید قبل از مصرف به خوبی با آب شستشو داده شود و برای اطمینان از جداسدن تخم انگل از سبزیجات، چند قطره مایع ظرفشویی به داخل ظرف شستشو اضافه شود، سبزیجات چند لحظه در داخل آب تکان داده شود تا آب کف نماید.

۳- محصور نمودن مزارع کشت سبزیجات

۴- کشتار دام‌ها در کشتارگاه های بهداشتی

۵- از بین بردن سگ های ولگرد

منابع:

<https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate>

<https://medlineplus.gov>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت **رایگان** همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰
وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

- زمان مراجعه بعدی به پزشک خود را (جهت ادامه درمان) فراموش نکنید.

- ۷ الی ۱۰ روز بعد از عمل جراحی جهت کشیدن بخیه ها به پزشک معالج خود، مراجعه نمایید.

- از بلند کردن اجسام سنگین و فعالیت سنگین پرهیز نمایید.

در صورت بروز چه علائمی باید به پزشک مراجعه نمایید؟

* باز شدن بخیه ها

* ترشح از زخم

* تنگی نفس

* درد شدید

* تب

چگونه می‌شود از ابتلا به این بیماری پیشگیری کرد؟

۱- رعایت بهداشت فردی و محیط

۲- ضد عفونی نمودن سبزیجات با توجه به اینکه



مددجوی گرامی:

این مطالب به منظور آشنایی با کیست هیداتیک کبدی و مراقبت های لازم بعد از آن تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

کیست هیداتیک چیست ؟

بیماری انگلی و مشترک بین انسان و دام که توسط نوزاد یک انگل ایجاد می شود.

کرم بالغ در روده سگ و نوزاد این کرم در بدن انسان و حیوان اهلی (نخوار کنندگان) زندگی می کند.

این بیماری با خوردن آب یا غذای آلوده به تخم های این انگل یا از طریق تماس با حیوان آلوده به این انگل منتقل می گردد.

تخم های این انگل در مدفوع حیوانات گوشت خواری یافت می شود که به این انگل آلوده شده اند.

در انسان از چه طریق امکان آلودگی وجود دارد؟

(۱) راه شایع تر: خوردن سبزیجات آلوده به مدفوع سگ و ورود تخم انگل به بدن



(۲) خوردن گوشت نیم پز و یا جگر خام گوسفند

مراحل بیماری در بدن انسان: در ابتدا انسان تخم انگل را می خورد (معده)، سپس (لارو) از تخم رها می شود و جدار روده را سوراخ می کند و از طریق گردش خون به سیاهرگ پورت، کبد، ریه و سایر ارگان ها می رسد و باعث ایجاد کیست می شود.

این بیماری چه علائمی دارد؟

پس از بلع تخم، هر اندامی از بدن می تواند محل بوجود آمدن کیست باشد و بسته به اینکه در چه اندامی کیست ایجاد شده باشد، اختلال در عملکرد همان عضو را خواهیم داشت. کیست های ریوی و کبدی شایع تر هستند.

علائم این بیماری از درد ساده در محدوده راست شکمی تا تنگی نفس، سرفه های خشک، عفونت های ثانویه بدنبال پاره شدن کیست در اعضای داخلی و شوک متغیر است.

گاهی تعداد این کیست ها به حدی در کبد افزایش می یابند که موجب از کار افتادن کبد خواهند شد که در صورت درمان نشدن منجر به مرگ می گردد.



کیست هیداتیک چگونه تشخیص داده می شود؟

* گرافی (عکس) از اندام های درگیر بیماری

* سونوگرافی

* سی تی اسکن

این بیماری چگونه درمان می شود؟

در حال حاضر جراحی کیست های هیداتیک در انسان تنها راه اساسی معالجه بیماری است.

توصیه های زمان ترخیص از بیمارستان:

- هنگام ترخیص و خروج از بخش حتما خلاصه پرونده و نسخه داروهای تجویز شده را دریافت کنید.

- در صورتی که نمونه برداری حین عمل داشته اید، در خلاصه پرونده شما قید می شود و جواب آزمایش آسیب شناسی (پاتولوژی) شما حدود ۱۰ الی ۱۴ روز بعد از عمل جراحی آماده می شود، لطفا پیگیر جواب آزمایش خود باشید.

